

四庫全書

子部

腹中有塊或腦後兩邊有小結核連復數箇或聚或散
沉沉默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或復下
利羸瘦困乏不自勝持積月累年以致於死死後乃症
易傍人乃至臧門者是也更有蜚尸遁尸寒尸喪尸尸
注等謂之五尸及大小附着等證不的知其所苦無處
不惡乃挾諸鬼邪而害人以三因攷之內非七情所忤
外非四氣所襲雖若麗乎不内外因奈其證多端傳變
遷移難以推測故自古及今愈此病者十不得一所謂

狸骨獺肝天靈蓋銅鑑鼻徒有其說未嘗見效唯膏肓
俞崔氏穴名四花有六穴若聞早灸之可否幾半晚亦
不濟也 病者增寒發熱自汗面白目乾口苦精神不
守恐畏不能獨卧其傳在肝 病者增寒發熱面黑鼻
燥忽忽喜忘大便苦難或復泄瀉口瘡其傳在心 病
者增寒發熱面青唇黃舌本強不能嚥飲食無味四肢
羸瘦吐涎沫其傳在脾 病者增寒發熱面赤鼻白乾
燥毛折咯嗽喘急時吐白涎或有血線其傳在肺 病

者增寒發熱面黃耳輪焦枯脰骨痠痛小便白濁遺瀝
胸痛其傳在腎

二十四種蒸病論

所謂勞蒸者二十四種隨證皆可考尋毛折髮焦肌膚
甲錯其蒸在皮 外人覺熱自反惡寒身振濶劇其蒸
在內 髮焦鼻衄或復尿血其蒸在血 身熱煩躁痛
如針刺其蒸在脉 爪甲焦枯眼昏兩脇急痛其蒸在
筋 版齒黑燥大杼酸痛其蒸在骨 背脊疼痛脰骨

酸癰其蒸在髓 頭眩熱悶口吐濁涎眼多眵淚其蒸
在腦 男子失精女子白淫其蒸在玉房 乍寒乍熱
中脘與臆中煩悶其蒸在三焦 小便赤黃凝濁如膏
其蒸在膀胱 傳道不均或秘或泄腹中雷鳴其蒸在
小腸 大腹隱痛右鼻乾疼其蒸在大腸 口鼻乾燥
腹脹睡卧不安白汗出其蒸在胃 口苦耳聾脇下痛
其蒸在膽 裏急後重肛門澁秘其蒸在回腸 小腹
疔痛筋脉縱緩陰器自強其蒸在宗筋 眼昏淚下時

復眩暈躁怒不常其蒸在肝 舌焦黑氣短煩悶洒洒
淅淅其蒸在心 唇乾口瘡胃腹脹悶畏寒不食其蒸
在脾 咳嗽喘滿咯痰吐血聲嘶音遠其蒸在肺 耳
輪焦枯脚氣酸疼起居不得其蒸在腎 情想不寧無
故泄精白物綿綿而下其蒸在右腎 心主胞絡心膈
噎塞攻擊疼痛俛仰煩冤其蒸在膈諸證雖曰不同其
根多有虫嚙其心肺治之不可不絕其根也

神仙秘法 取傳尸勞虫服此藥須先擇良日焚香禱

祝令病人設榻面向福德方服即有神效不可使病人知其藥味及子細

青桑皮

楊柳枝

梅枝

桃枝

已上要取東引者各七莖

葱白

七莖青蒿一握如無以子代

真安息香

一分研去石

阿魏一分

右八味除阿魏外用童子小便一升半煮取藥耗及一半去滓將藥汁化阿魏再煮十數沸去滓候溫作貳次調下件藥末

朱砂

半兩

小檳榔

半兩

麝香

半分

右三味研令極細分為二服用前湯使調下五更初
一服三點再一服辰時間取下虫遂絕根本若見虫
色白者此病必差若黑色則已傳入腎經不可救也
服藥後只以淡粥補之並不動元氣効驗無比切須
秘之世傳勞虫有靈輕易傳之則傷醫者此說殆醫
者秘惜其方不可以授人耳要須密重之則無洩慢
天機乃起死還生功同造化鬼神護助自有靈効大
凡傳屍勞者必須先服此一藥後十五方隨證治不

可以槩用藥調治三五箇月再服此取虫藥則永除
根本如取下虫色已黑縱服後藥亦無補也然亦能
使不傳它人

治心胃積氣作胃痺引兩脇痛昏悶不收音聲不清虛
熱上壅作鼻衄方

桑白皮分三枳殼 木通 子芩 生乾地黄 白

芍藥 甘草 各半兩

右為粗末每服三錢重水浸半煎至七分去滓溫服

食後

治伏瘀血在心肺時作衄心胃徹背痛方

白芍藥

牡丹皮

各一兩

生犀屑

半兩生地黃

三兩別槌碎入

右㕮咀每服半兩水一大錢煎至七分去滓溫服

調榮衛消瘀血出聲音治痰嗽方

川當歸

牡丹皮

白芍藥

子芩

木通

麥

門冬

甘草

華陰細辛

各半兩

生乾地黃

一兩

右㕮咀每服三錢水一錢薑三片煎至七分去滓溫

服

治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血雞蘇圓

雞蘇葉

半斤

黃耆

半兩

甘草

川芎

各一分

防風

一分

苦梗

半兩荆芥穗

一分

甘菊花

分

真腦子

半錢

生乾地黃

半兩

兩

右為細末煉蜜圓如彈子大每服一圓用麥門冬去

心煎湯嚙下又治肺損吐血日漸乏力瘦弱行步不

得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澁加車前

子一分每服一圓煎桑枝湯嚙下日可六七服桑枝

劉炒香每用水三錢煎至一錢去滓下藥

治勞氣食後身疲倦夜間盜汗此病因失血榮衛損也

宜防風湯方

黃耆一兩白芍藥

防風

各三分

甘草

半兩當歸

生乾

地黃

各三分

右咬咀每服三錢水一錢薑三片棗一箇煎至七分

去滓溫服食前服

治勞嗽溫金散

甘草 黃芩 桑白皮 防風 各一兩 杏仁 二十七粒製

人參 去蘆 茯神 各半兩 麥門冬 一分

以前五味用米泔浸一宿曬乾次入人參茯神麥門冬三味同為細末每服二錢水一錢蠟一豆大煎至八分食後溫服

治勞嗽有四滿員極妙 方見勞嗽門

治心氣不足解勞倦益血桔梗飲子

苦梗 甘草 黃耆 人參 去蘆 麥門冬 各一兩 青皮

兩半

右為末每服二錢水一錢煎至七分溫服

治胃痺瓜樓湯

枳殼

四箇

厚朴

薤白

各一兩

瓜樓

一箇

桂枝

一兩

有熱除此一味

右咬咀水七升煎取四升去滓溫服

涼心肺解勞除熱使榮衛順血不絕子苓散

黃耆

一兩

白芍藥

子苓

人參

白茯苓

麥門

冬

苦梗

生乾地黄

各半兩

右為粗末先用竹葉一握小麥七十粒水三錢薑三片煎至水一錢半入藥末三錢重煎至七分去滓溫服

治積氣堅硬作氣噎胃脅引背痛方

白芍藥

一兩半

鰲甲

醋炙

枳殼

去穰麩炒

北柴胡

各一兩

甘草

赤茯苓

各半兩

右咬咀每服三錢水一大盞薑三片棗一箇煎至七分去滓溫服

治伏連傳注腹中有堅硬積氣壅心胃作痺痛引脇背
痛腕膈滿悶方

鬼臼

天門冬

去心各三分

巴豆

一分去皮心炒

莽草

不蛀

皂角

酥炙各半兩

葉子雄黃

一兩

右為細末煉蜜為圓如小豆大每服一圓漸加至三
二圓空心湯水吞下臨卧一服常宜斟酌勿令泄瀉
忌鯉魚山猪蘆筍

出聲音方

訶子

炮去核

木通

各一兩

甘草

半兩

右咬咀用水三升煎至升半入生地黃汁一合再煎數沸放溫分六服食後日作半料

治咽喉痛方

百藥煎

去黑皮

鵬砂

甘草

生白礬

等分

右四味為細末每服一錢食後米飲調細細呷嚥

治肺間邪氣胃中積血作痛失音含化圓方

蛤蚧

一雙去口足炙

訶子

去核

阿膠

粉炒

麥門冬

去心

北細辛

甘草 生乾地黄

各半兩

右為細末煉蜜為圓如雞頭子大食後含化一圓

已上諸方辰州李倅名景適錄示云傳之於五羊大

帥方侍郎

上務下德

治療疾得效方河車圓

治勞嗽一切勞瘵虛損骨蒸

等疾

河車一枚

初生男子者尤良於長流水中蕩洗盡血淨入鍋內煮熟以手擘成小片焙乾

須在一日內便碾成末纔經宿即不乾碾不成末矣按本草云人肉治療病胞衣飄生者尤佳主血

氣羸瘦婦人勞損面黥皮黑腹內諸疾漸漸瘦悴者以五味和之如鮠鉀法與服之勿令病者知亦治天行熱癘立效胞衣埋地中七八年化成水澄清如真水南方之人以甘草升麻和諸藥釀盛埋之三五五年揆雪白茯苓兩揀參一兩乾山藥二兩此為藥服

右為細末麪糊為圓如梧桐子大以少麝香末為衣每服三五十圓米飲溫酒鹽湯送下空心服嗽甚者五味子湯下

又方治肌瘦咯血肺痿等疾

蛤蚧

一雙全者酒浸一宿酥炙

知母

貝母

去心

人參

去蘆

甘草

杏仁

去皮尖
麩炒

枇杷葉

去毛
炒

鹿角膠

粉炒

右各一兩依方事治淨秤為末每服三錢水一錢入
桑白皮煎至八分溫服日三夜二

治勞嗽補肺湯

桑白皮

熟地黃

各二兩

人參

去蘆

紫苑

黃耆

川

五味子

各一兩

右為細末每服二錢水一錢煎至七分入蜜少許食
後溫服

又四君子湯加秦艽黃蠟煎服尤妙

辰陽李倅云已上藥方乃趙世則傲之次子公璵並服此乃安傳之仲弟屢救人甚驗服藥止可食淡煮猪蹄肉仍須先煮熟肉去元汁再以白湯熟煮仍忌房勞一切生冷魚腥鹹毒醃藏等物無不痊愈修合藥及煎藥時忌生人孝子婦人雞犬猫畜見仍勿令病人知用藥味大有功效

治傳尸出汗取虫辟邪養正膏

鼈甲

一兩醋炙

青蒿

一握

淡豉

三七粒

葱白

兩莖

安息香

一分研

桃柳桑枝

各七莖

桃仁

四十九皮尖雙仁

去

天靈蓋

用七頭大一片

酥炙

右十味隔夜以水一升浸至五更煎至半升再以童便半升同煎取四合又用檳榔一箇為末麝香一錢匕將所煎藥去滓調下至日高二丈時放溫頓服以衣覆出汗審看十指汗出如藕絲五色臭穢汗出後仍瀉下虫狀惡物盡甚者旬日再服永效

猪肚元 治骨蒸勞唇頰赤氣粗口乾遍身壯熱或多虛汗大腸澀秘小便赤黃飲食全少

出博濟方

青蒿 鼈甲

醋炙

北柴胡

木香

生乾地黃

各一兩

青皮半兩宣黃連二兩

右為末以猪肚一箇洗淨入藥在內繫定蒸令極軟
研如泥為圓如綠豆大湯下十五元空心日三服忌
濕麪毒物

婦人骨蒸勞方論第二凡十五方

夫骨蒸勞者由熱毒氣附骨故謂之骨蒸也亦曰傳尸
亦謂殭殍亦稱復連亦名無辜丈夫以瘰癧為根女人
以血氣為本無問少長多染此病內既傷於臟腑外則

損於肌膚日久不痊遂至羸瘦因服冷藥過度則傷於脾脾氣既衰而傳五臟脾初受病或脹或妨遂加洩痢肌肉瘦瘠轉增痿黃四肢無力飲食少味脾既受已次傳於腎腎既受病時時盜汗腰膝冷疼夢鬼交侵小便赤黃腎既受已次傳於心心既受病往往忪悸或喜或嗔兩頰常赤唇色如朱乍熱乍寒神氣不守心既受已次傳於肺肺既受病胃滿短氣咳嗽多唾皮膚甲錯狀如麤片肺既受已次傳於肝肝既受病兩目昏暗脇下

妨痛不欲見人常懷忿怒五臟既病漸漸羸瘦即難療也

天靈蓋散 治婦人骨蒸勞四肢無力每至晚間即熱兩頰紅色食飲不下心神煩躁

天靈蓋炙酥安息香地骨皮當歸山梔子仁

人參去蘆貝母去心黃連桃仁去皮尖雙仁麩炒黃檳榔各一兩

鼈甲炙醋北柴胡生乾地黃赤茯苓麥門冬

各一兩半阿魏

右為粗末以童子小便一大椀桃柳枝各七寸薑五片葱白五寸藥四錢煎至七分去滓溫服

獺肝元 治婦人骨蒸勞熱體瘦煩疼不欲飲食

獺肝一具 鼈甲醋炙

北柴胡各兩半

朱砂

桃仁去皮尖雙仁麩

炒黃川升麻

天靈蓋酥炙

犀角屑

梔子仁

地骨

皮

知母各一兩

黃耆三分

甘草半兩麝香一分研

右為細末煉蜜負如梧桐子大溫水下三十負無時候

黃耆元 治婦人骨蒸煩熱四肢羸瘦疼痛口乾心躁
不得眠卧

黃耆 麥門冬去心 茯神 北柴胡 甘草 生乾

地黃各一兩 酸棗仁炒 郁李仁 杏仁去皮尖雙 黃柏

杞子 人參去蘆 黃芩各三分 百合 枳殼去穰 赤芍

藥 知母各半兩 鼈甲二兩製

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大清粥吞下三十丸

無時候

煞鬼負

治婦人骨蒸傳尸勞瘦鬼氣伏連

已上出聖惠方

麝香

三分

犀角屑

木香

白朮

各一兩

鬼箭羽

虎

頭骨

酥炙

天靈蓋

酥炙

辰砂

桃仁

去皮尖雙仁麩炒黃

雄黃

各兩

半

右為細末煉蜜為負如梧桐子大溫水下二十負此藥亦辟瘟疫亦可帶之

鼈甲煎

治勞

見專治婦人方

雄鼈

一個重一斤者

杏仁

去皮尖雙仁炒

北柴胡

貝母

去心

知母

各四
兩

右除鼈外諸藥細剉以好酒五升入鍋內將活鼈在
中以藥和停圍定上用板子石壓定令鼈在藥內喫
酒藥候來日却以慢火煮候酒盡為度却取鼈令患
人喫盡次將鼈甲用醋炙黃入在前項諸藥內焙乾
為細末用酒煮麴糊元如梧桐子大用米飲吞下三
十元無時候日五服

麥煎散 治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心胃

煩壅

赤茯苓

當歸

乾漆

生鼈甲

醋炙

常山

大黃

煨

北柴胡

白朮

生乾地黄

石膏

各一兩

甘草

半兩

右為細末每服二錢水一錢小麥五十粒煎至六分
食後臨卧時溫服有虛汗加麻黃根一兩蘇東坡云
此黃州吳判官方療骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗極效
麥煎散甚多此方吳君寶之如希世之珍其效可知
筒骨煎 治諸虛勞疾羸瘦乏力腰背引痛心煩喘嗽

唾膿嘔血頑涎壅盛睡卧有妨胃滿氣促夜多盜汗髮焦耳鳴皮寒骨熱一切五勞七傷骨蒸等候並皆療治

許元林
先生方

地骨皮 粉草 北柴胡 前胡 烏藥 麻黃

不去節 乾葛 青蒿 苦梗 知母 天仙藤 北

黃芩 各一人參 生乾地黃 秦艽 鼈甲 黃

耆 各半兩

右咬咀每服三錢水一錢酒一分猪筒骨一莖炙焦

分為四服桃柳枝各七寸杏仁五粒去皮尖槌碎煎

至七分去滓溫服加烏梅半箇尤妙

一方加當歸白芍藥

華佗方大靈治傳尸明月丹方

雄黃

木香

各半兩

天靈蓋

炙一兩

輕粉

分一釐甲醋炙一兩

兔屎

二兩

右為末用法酒一大升大黃半兩為末熬膏入前藥為元如彈子大朱砂為衣傳尸勞肌瘦面黃嘔吐咳嗽不定先燒安息香令烟出吸之不嗽非傳尸也不

可用此藥若烟入口咳不能禁止乃傳尸也宜用此藥五更初服勿令人知以童便共酒一錢化一元服如人行十里久必吐出虫狀如燈心細長及寸或如爛瓜李又如蝦蟇狀各不同未效次日再服以應為度

蘓沈良方治諸勞明月丹

兔糞

四十枚
硃砂

如兔屎大
四十九枚

右細研生蜜元如梧桐子大以甘草半兩碎之水浸

一宿取汁五更初下七元勿令病人知勞藥下後頻看若有虫急打殺以桑火油煎使焦棄急水中三日不下更服須在月望前日服忌見喪服色衣婦人猫

犬之類後服治勞補氣藥取差

沈內翰云威愍孫元規藏此方數能活人

江陰萬融病勞四體如焚垂困一夜夢人腹墜一月如大盤明爛不可正視逼人心骨皆寒已而悸寤俄頃扣關乃威愍使人遺之藥服之遂差問其名則明月丹也始悟向之所夢大體此藥最治熱勞又云傷寒煩躁骨熱皆能治療一方有鵝砂等分

鮮勞生肌進食活血養心地黃煎元

有人云甚妙

華佗方

生地黄汁 杏仁汁 生薑汁 藕汁各五升 薄荷

汁 鵝梨汁各一升 法酒二升 沙蜜四升

右慢火熬成膏入後藥

北柴胡去蘆三兩 木香 人參 茯苓 山藥 栢子

仁去皮炒研 遠志去心 枳實去穰炒 白朮各一兩 秦艽 苦梗

並去蘆各二兩 麝香半兩研 熟地黄洗焙酒蒸四兩

右為末以前膏子和勻如梧桐子大食後甘草湯下

二十元

治骨蒸寒熱名醫錄云睦州楊寺丞有女事鄭迪功女
有骨蒸肉熱之病時發外寒寒過內熱附骨蒸盛之時
四肢微瘦足跌腫者其病在五臟六腑之中衆醫不瘥
因遇處州吳醫看曰請為治之只單用石膏散服之體
微涼如故

石膏散方

見靈苑方

真石膏

不以多少
研令極細

石新汲水和服方寸匕取身無熱為度

外臺秘要
本草同

青蒿散 治男子婦人肢體倦疼虛勞寒熱 靈苑方

青蒿八九月間成實時採去枝梗以蒿用童子小便浸三日燉乾為末每服二錢烏梅一箇煎至七分溫服

青蒿鼈甲煎元 治骨蒸勞退熱解肌進食 出博濟方

九肋鼈甲一箇北柴胡二兩甘草 杏仁 桔梗 當

歸 人參 地骨皮 赤芍藥各一兩胡黃連 宣

連各一兩官桂 木香各半兩麝香一兩酥 蜜各三兩

右十四味同為細末用青蒿一斤童子小便五升好酒一升熬青蒿汁約二升已來攪去青蒿不用入酥蜜再熬成膏冷後入藥末搜和為元如梧桐子大每服十五元溫酒下米飲亦得日進三服如秋後合時更入桃柳枝七莖此藥甚妙

五心煩熱附

五心煩熱頰赤宜局方逍遙散秦艽散

方見第六卷第一論

逍遙散 治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重

心忪顙赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏
月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又療室女血弱陰虛榮
衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

白茯苓

白朮

當歸

去蘆酒浸
半日微炒

白芍藥

北柴

胡

去苗各
一兩

甘草

炙兩
半

右咬咀每服三錢水一盞煨生薑一塊切片薄荷三
葉同煎至七分去滓熱服無時候

枳殼散

治婦人手足煩熱夜卧多汗肌肉黃瘁經候

不調四肢煩倦心胃滿悶狀如勞氣

枳殼

去穰麩炒二兩

半夏麩

赤芍藥

各一兩

柴胡

黃芩

各一兩半

右為細末每服二錢水一錢生薑一塊擘破棗二枚煎至八分去滓溫服候五心煩熱及身體壯熱潮熱退方續服

婦人血風勞氣方論第三

凡十四方

夫婦人血風勞者由氣血虛損經候不調或外傷風邪

或內挾宿冷致使陰陽不和經絡否澁腹中堅痛四肢
酸疼月水或斷或來面色萎黃羸瘦又有因產後未滿
百日不謹將護臟腑虛損百脉枯竭遂致勞損之疾也
人參荊芥散 治婦人血風勞氣身體疼痛頭昏目澁
心忪煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胃滿精神不爽或
月水不調臍腹疔痛瘰癧塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲
食不進或因產將理失節淹延瘦瘁乍起乍卧甚即着
床

荊芥穗 人參 桂心 生乾地黄 北柴胡

鼈甲

醋炙

酸棗仁

炒

枳殼

製 羚羊角屑

別為末

白朮

各七

錢半 川芎

當歸

防風

甘草

各半兩

右為粗末每服三錢水一錢半生薑三片煎至八分

去滓熱服無時候日二服常服除一切風虛勞冷宿

疾孕婦休服

鼈甲元 治婦人血風勞氣四肢羸瘦疼痛經脉不利

飲食無味漸加虛困

鼈甲 紫苑 桂心 川芎 防風 川牛膝

當歸 秦艽 人參 桃仁 琥珀 各一兩 麝香 一分

黃耆 赤芍藥 蟲虫 製水蛭製 鬼箭羽 白朮

羌活 各三分 熟乾地黄 兩半

右為細末煉蜜元如梧桐子大食前溫酒吞下三十元

琥珀元 治血風虛勞上熱下冷或發動即心中煩燥困乏無力不美飲食醋心口瘡月水不調肌肉黃痒腹

痛腸鳴或有氣塊攻衝或時作寒熱頭旋痰逆手足麻痺大宜常服出博濟方

琥珀 當歸 木香 川芎 防風 檳榔各四分

三稜炮 乾薑炮 桂心各五分 吳白朮洗 柴胡 人參

各二分 青皮 吳茱萸洗泡炒黑 全蝎炒 附子炮 草豆蔻

赤芍藥 柏葉 白芷各三分 桃仁去皮尖炒 敗龜醋炙

鼈甲各六分 天麻三分

右為細末煉蜜元如梧桐子大每日空心酒下二十

元午前近晚更進一服如覺煖近晚不須服如腹內塊積攻築於鼈甲桃仁檳榔三稜各加一倍為妙忌生冷蔥薤菜毒魚等物

香甲散 治婦人血氣虛勞四肢少力肌肉黃痺多困減食遍身痠疼真邪相擊心腹撮疼

木香

乾薑

各三分

鼈甲

醋炙二兩

牡丹皮

赤芍藥

橘紅

桂心

人參

茯苓

熟地黃

秦艽

柴胡

白朮

炒

當歸

炒附子

炮去皮各一兩

甘草

半兩

右為粗末每服二錢水一錢生薑三片棗二枚煎至七分去滓稍熱服如煩渴心躁入烏梅一兩同杵為末

地黃煎 治婦人血風勞心忪發熱不退 出經驗方

生乾地黃 熟乾地黃

右二味等分為細末用生薑自然汁入水相和打糊為元如梧桐子大每服三十元用地黃湯下或只茶酒醋湯下亦可食後日三服覺臟腑虛冷早間先服

八味員一服

不可謂地黃性冷沮如壞脾大槩陰虛則發熱蓋地黃大能補陰精血也

荊芥散

治血風諸般疾產後並宜服食久服諸疾除

去

荊芥

雀腦芎

各三兩

當歸

人參

各半兩

桂心

牡

丹皮

羌活

防風

苦梗

大腹子

甘草

蒲黃

白茯苓

枳殼

厚朴

半夏

杏仁

款冬花

各三分

附子

炮

乾地黃

鼈甲

白芍藥

北柴胡

黃耆

各一兩

乾薑

木香

各半分

沉香

一分

右為細末每服二錢薑三片棗一枚水一錢煎至七分溫服

荊芥煮散 治婦人血海虛冷手足煩疼頰赤口乾背甲勞倦寒熱往來咳嗽痰涎飲食進退血經不調多驚盜汗胃膈不快但是風勞氣冷並皆治之

荊芥穗

四兩北柴胡

秦艽

白芷

黃耆

各二兩當

歸 莪 茂

川芎

麥門冬

白茯苓

人參

白芍藥

沉香

海桐皮

枳殼

熟地黃

甘

草 酸棗仁 木香 檳榔 各一兩 鼈甲 製 白豆蔻

桂心 苦梗 各二兩

右為細末每服二錢生薑三片烏梅一箇煎至七分
無時溫服如極虛去檳榔每日兩服臨卧服尤佳忌
生冷動風甜物腹有顆塊服之便消

如聖散 治婦人所稟血氣不足不耐寒暑易冒疾傷
月水不調久而心虛狀若心勞四肢易倦筋骨少力盜
汗易驚或時不寧五心煩熱肌膚不長間作頭昏飲食

無味胃膈不利或產前產後受病並可服之

北柴胡 白茯苓 甘草 熟地黄 人參 當

歸

各一兩

鼈甲

胡黃連

沉香

知母

各半兩

桑寄生

生

乾葛

各三分

右為細末每服二錢水一錢烏梅一箇棗二枚麥門冬數粒煎至八分無時候

乞力伽散 治血虛肌熱又治小兒脾虛蒸熱羸瘦不能飲食

白朮 白茯苓 白芍藥

各一兩半

右為細末薑棗煎二錢服

油煎散 治血虛寒熱四肢酸倦無力瘦瘁不進飲食

日三服

川烏 海桐皮 地骨皮 五加皮 桂心 牡

丹皮 陳橘皮 白芍藥 川芎 當歸 烏藥

白芷 莪茂

等分

右為末每服二錢水二錢入生麻油三四點煎至七

分溫服無時候

大效油煎散 治血風勞氣攻症四肢腰背疼痛嘔逆
醋心不思飲食日漸羸瘦面色痿黃手足麻痺血海冷
敗服此神效

五加皮

川烏

炮

芍藥

海桐皮

牡丹皮

各一兩

桂心 乾薑

川芎

各半兩

右為細末每服二錢水一錢油浸錢一文同煎至六
分溫服常服以油浸二錢煎藥時不可攪喫藥時不

可吹

局方亦有油煎散

方見和劑

四白散子亦妙

見四卷第九論

治血風勞方

牡丹皮

地骨皮

防風

甘草

黑豆

白芷

白芍藥

各一兩

荆芥穗

二川芎一分

右為細末每服二錢水一盞薑三片棗一箇葱白一寸煎至八分溫服無時候

香甲散

治熱病後虛勞或四肢倦怠脚手疼痛飲食

無味肌膚黃瘦或熱瘡盜汗頭暈虛煩此藥久服駐顏
其妙不可具述

鼈甲

三兩醋浸去裙炙黃
又入醋煎炙七次

當歸

木香

人參

羌活

川芎

沉香

肉豆蔻

酸棗仁

附子

檳榔

大腹子

各半兩

北柴胡

兩半

厚朴

川牛膝

白茯苓

秦艽

各一兩

桂心

兩半

右咬咀每服五錢水一錢生薑三片烏梅一箇煎至
八分去滓溫服日三服空心忌生冷麪食雞肉鮓醬

之類

馬鞭草散

治血風攻透肢體疼痛或覺癢痒或覺痺

麻作寒作熱飲食減味並皆治之

已上出專治婦人方

馬鞭草

去粗梗

荆芥穗

北柴胡

烏梅肉

各二兩

枳

殼

白朮

羌活

白芍藥

各一兩

秦艽

天台烏

藥

藥 麻黃

各兩半

木香

兩半

當歸

川烏

炮

甘草

各一兩

右為細末每服二錢水一盞生薑二片棗一枚葱白

二寸煎至七分日午臨卧溫服常服無忌有孕莫服

婦人風虛勞冷方論第四 凡二方

夫婦人風虛勞冷者是人體虛勞而受於冷也夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞傷氣血便至虛損則風冷乘虛而干之或客於經絡或入於腹內其經絡得於冷則氣血凝滯不能自溫於肌膚也腹內得於風冷則脾胃氣弱不能消於飲食也隨其所傷變成疾病若大腸虛者則變下利若風冷入於子臟則令臟冷致令無子若搏於血則澁壅亦令經水不利斷

絕不通也

澤蘭散 治婦人風虛勞冷氣攻心腹疼痛肢節拘急
體瘦無力經候不調飲食減少

牡丹皮

赤芍藥

栝子仁

續斷

各半兩

麝香分

澤蘭葉

二兩當歸

延胡索

桂心

附子

炮

川牛

膝川芎

桃仁

乾漆

炒琥珀

沒藥

木香

各三分

右十七味為細末每服二錢溫酒調下

紫石英圓 治婦人風虛勞冷經候不調四肢羸弱不能飲食

紫石英 熟乾地黄

白石英

各二兩續斷

白芍

藥桂心

木香

當歸

白朮

乾薑

白薇

各半兩

川牛膝

川芎

北五味子

人參

各三分

椒

紅炒附子

黃耆

各一兩

石為末煉蜜為元如梧桐子大每服三十元溫酒吞下空心服

婦人冷勞方論第五 凡七方

夫婦人冷勞者由血氣不足表裏俱虛臟腑久挾宿冷致令飲食不消腹內積聚臍下冷痛月候不調骨節痠痛手足無力肌膚羸瘦面色痿黃故曰冷勞也

桃仁散 治婦人冷勞氣滯經脉不通腹脇妨悶四肢羸瘦不思飲食

木香 訶子 白薑 桃仁 人參 各半兩 陳皮

琥珀 桂心 各一兩 赤芍藥 延胡索 赤茯苓

川牛膝 當歸 白朮

各三分

右咬咀每服四錢水一盞薑三片煎至七分去滓空

心溫服

木香元 治婦人冷勞經脈不調臟腑氣滯四肢疼痛
飲食無味漸加羸瘦

木香 琥珀 吳茱萸 泡 當歸 牡丹皮 赤芍

藥 三稜 附子炮 延胡索 川芎 各三分 乾薑

人參 桂心

各半兩

北柴胡

白朮

鼈甲

醋煮去裙炙

厚朴 熟地黄 陳橘皮

各一兩

右為末煉蜜元如梧桐子大每服三十元空心溫酒

下

熟乾地黄元 治婦人冷勞虛損肌體消瘦顏色痿黃

四肢無力月候不調少思飲食

乾熟地黄 鼈甲 陳皮

各一兩

北五味子

當歸

川芎

桂心

各半兩

川牛膝

人參

白芍藥

白朮 附子

白茯苓

黃耆

各三分

甘草

一分

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下三十元

礪砂煎元 治婦人冷勞心腹積聚腹脇疼痛四肢羸

瘦不食

鼈甲

炙醋桃仁去皮尖

木香

五靈脂

去砂石炒當歸各一

兩

礪砂

二兩醋一升熬成膏

右為細末用礪砂膏為元如梧桐子大空心溫酒下

二十元

煮肝散

治婦人冷勞脾胃虛之大腸轉洩水穀不化

四肢羸瘦口内生瘡不思飲食漸加無力宜服此藥

北柴胡 縮砂仁 蒔蘿 華撥

各三分

白朮 白

芷 胡椒 白薑 陳皮 山茵陳 人參 蕪

荑仁 木香 紫苑 白芍藥 北細辛 桂心

各半兩

右為細末以獾猪肝一具去脂膜切如柳葉片以新汲水洗過入葱白三寸細切入藥末半兩於鉢內以新水二大錢入鹽醋少許以瓷碗合煮令水盡空心

以意食之喫粥飲下食後良久飲暖酒一盞為妙晚
食前再服亦佳

煮肝散 治婦人冷勞面色痿黃不多思食或時腹痛
四肢少力積漸羸瘦

白芍藥 川芎 苦梗 厚朴 桂心

各三分

陳皮

一兩半 白薑 當歸 荊芥穗 蒔蘿 胡椒 蕪

荑仁 藁本 柴胡 紫苑

各半兩

右為細末每服半兩以獾猪肝一具用鹽醋葱白各

少許相和如尋常煮熟空心任意食之然後飲溫酒
二錢尤佳

大香甲元散 治婦人血臟風虛冷氣肌肉黃瘦飲食
進退經候不調心腹多脹漸變如勞補血海調氣

鼈甲

醋炙
一兩

沉香

柴胡

人參

川芎

羌活

當歸

附子

炮去
皮

木香

安息香

桔梗

茯苓

藿香葉

陳橘皮

牡丹皮

三稜

厚朴

薑汁

炙桂心

桃仁

去皮
尖炒

牛膝

去苗各
半兩

檳榔

和皮大

腹子

各一分

右為細末每服二錢水一盞生薑烏梅各少許煎至

八分溫服餘一半更加乾漆

炒一分

阿魏

半分

赤芍藥

一分

同為末煉蜜元如梧桐子大空心煎烏梅地黃湯下

二三十元與散子相間服

博濟方

婦人大全良方卷五

欽定四庫全書

子部

婦人大全良方卷六

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

謄錄舉人臣馮盡

欽定四庫全書

婦人大全良方卷六

宋 陳自明 撰

婦人熱勞方論第一

夫婦人熱勞者由心肺壅熱傷於氣血氣血不調臟腑壅滯熱毒積蓄在內不得宣通之所致也其候心神煩躁頰赤頭疼眼澁唇乾四肢壯熱煩渴不止口舌生瘡神思昏沈多臥少起飲食無味舉體痠疼或時心忪或

時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞也

黃耆散 治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心躁口乾不欲

飲食

人參

黃芩

當歸

各三分

北柴胡

去苗兩半

黃耆

地

骨皮

赤茯苓

麥門冬

生地黄

赤芍藥

各一

兩

甘草

一分

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎六分去滓溫服

無時

半夏散 治婦人熱勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼痛
或時寒熱痰逆嘔吐不思飲食

半夏 知母 苦梗 人參 赤茯苓 秦艽

赤芍藥 麥門冬 烏梅肉 各半兩 鼈甲 醋炙 北柴胡

黃耆 各一兩 大腹皮 三分 甘草 一分

右為粗末每服四大錢水一盞半生薑三片煎至七
分去滓溫服無時候

猪肚元 治婦人熱勞羸瘦

北柴胡 赤茯苓 人參 黃耆 各一兩 黃連 三兩

骨皮 木香 各半兩 桃仁 鼈甲 各一兩半

右為細末用好嫩猪肚一枚淨洗將藥末入猪肚內以線縫合蒸令爛熟於砂盆內研如膏員如梧桐子大食前粥飲下三十元午食前再服

秦艽散 治血經有熱月脈凝滯五心煩倦 出婦人經驗方

麥門冬 秦艽 各一兩 生地黃 當歸 各半兩 地骨皮

鬱金 蘇木 各一分

右為細末每服一錢半水一盞紅花少許同煎至七分溫服若經脈調不用紅花忌酒與熱物此方可服
一年

婦人客熱方論第二

凡三方

夫婦人有氣血陰陽臟腑虛實實則生熱虛則受邪邪熱加人陰陽冷熱自相乘也今云客熱者是體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客熱其狀上焦胃鬲之間虛熱躁心煩手足壯熱者是也

麥門冬散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

麥門冬 北柴胡 赤茯苓_{各一兩} 羚羊角屑 赤

芍藥 桑白皮 黃耆_{各三分} 生乾地黄 甘草_{各半兩}

兩

右呖咀每服四錢水一盞薑三片煎六分去滓溫服
無時候

犀角散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

犀角屑 赤芍藥 地骨皮 紅花 甘草_{各半兩}

北柴胡 一兩 黃耆 一兩 麥門冬 人參 枳殼

赤茯苓 各三分

右以咀每服四錢水一盞半薑三片煎七分去滓無時溫服

黃耆散 治婦人客熱心胃壅悶肢節煩疼不思飲食

生乾地黃 黃耆 各一兩 犀角屑 甘草 瓜樓子

仁 黃芩 各半兩 人參 茯苓 各三分

右為細末每服二錢水一中盞淡竹葉五片煎至七

分溫服無時候

婦人寒熱方證第三

凡四方

經云陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒夫婦人勞傷氣血虛弱令陰陽交爭虛實不調故令寒熱如癰也

地骨皮散 治婦人血風氣體虛發歇寒熱

北柴胡 地骨皮 一兩 桑白皮 枳殼 前胡

黃耆 各三分 白茯苓 五加皮 人參 甘草 桂

心

白芍藥

各半兩

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓
溫服無時候

生地黄散 治婦人血氣不調或時寒熱體痛不思飲食

生乾地黄

北柴胡

各一兩

羌活

木香

桂心

防風

各半兩

酸棗仁

羚羊角屑

白芍藥

白朮

黃耆

川牛膝

白茯苓

當歸

枳殼

各三分

右呖咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫服空心

柴胡散 治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北柴胡 黃耆 赤茯苓 白朮各一兩 人參 地

骨皮 枳殼製 生乾地黄 苦梗 桑白皮 赤

芍藥各三分 鱉甲炙二兩 麥門冬三兩 甘草半兩

右呖咀每服四錢水盞半薑三片煎七分去滓溫服

無時候

荊芥散 療時氣風溫寒熱瘴瘧往來潮熱並宜服之

陳皮 麻黃 香附子 甘草 各一兩 荊芥穗 厚

朴 各二兩 草果仁 三箇 川白芷 桂心 各半兩

右咬咀每服二錢水一大盞薑三片棗兩枚煎至七分去滓溫服無時候

寡婦寒熱如瘧方論第四 凡一方

論曰寡婦之病自古未有言者惟倉公傳與褚澄略而

論及言寡者孟子正謂無夫曰寡是也如師尼喪夫之婦獨陰無陽欲男子而不可得是以慙慙成病也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陽獨陰可乎夫既處閨門慾心萌而不遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類瘧疾久則為勞又有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶面黥瘦瘠等證皆寡婦之病診其脉獨肝脈弦出寸口而上魚際究其脉原其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

生地黃元 許學士云有一師尼患惡風體倦乍寒乍
熱面赤心煩或時自汗是時疫氣大行醫見寒熱作傷
寒治之大小柴胡湯雜進數日病劇予診視之曰三部
無寒邪脈但厥陰肝脈弦長而上魚際宜服抑陰等藥
予製此方治之愈

北柴胡 秦艽

黃芩

各半兩

生地黃

二兩

赤芍藥

一兩

右為細末煉蜜為元如梧桐子大烏梅煎湯下三十

元無時候日三服

許學士云嘗讀史記倉公傳載齊北王侍人韓女病腰背痛乍寒乍

熱衆醫皆以為寒熱病也倉公曰病得之欲男子而不可得也何以知欲男子而不可得診其脈肝脈弦出寸口是以知之又有婦人熱入血室寒熱如瘧一證在本卷第十論

婦人惡寒方論第五

凡一方

論曰夫婦人惡寒者亦有陰陽二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表脈必浮數發於陰者宜溫裏脈必沈細又有汗後利後惡寒及背惡寒已上疾證方治并載百問不復繁引僕嘗治一婦人但惡寒別無他證六脈平靜遂用敗毒散而

安此藥能去表中風邪故也經云惡寒家慎不可過當
覆衣被及近火氣寒熱相薄脈道沈伏愈令病人寒不
可遏但去被徹火兼以和表之藥自然不惡寒矣婦人
惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結聚針藥所以不能
治矣

敗毒散 見局方

婦人血風煩悶方論第六

凡四方

夫婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪乘之

搏於血使氣不宣而否溢則生於熱或肢節煩疼口乾少臥皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也

川烏頭元 治婦人血風虛冷月候不調或即脚手心煩熱或即頭面浮腫頑麻

川烏頭

一斤用好清油

各四兩一處於銚內炭

火炒不住手攪候裂者仍須如桑根色為度逐旋取出了於新瓦上或不裂者不用裂者則去皮尖臍

五靈脂

去土石揀淨四兩生

右為細末更入臼中或乳鉢內研令停後將蒸餅水浸後却瀝去水漸漸入臼中和杵直待元得即元如

梧桐子大空心溫酒或鹽湯下二十元忌動風物丈夫風疾亦治

赤芍藥散 治婦人氣血不和心胃煩悶不思飲食四肢少力頭目昏眩身體疼痛

牡丹皮 白茯苓 赤芍藥 白芷 甘草

各一兩

柴胡

半一兩

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至七分溫服食後臨臥

酸棗仁散

治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁喫

食減少

酸棗仁

赤芍藥

當歸

羚羊角屑

赤茯苓

紅花

生地黃

各三分

防風

羌活

川牛膝

麥

門冬

桂心

川芎

地骨皮

甘草

各半兩

右㕮咀每服四錢水盞半薑三片薄荷少許煎七分

溫服

當歸散

治婦人血風潮熱

當歸

二兩

芍藥

延胡索

不灰木

熟地黃

各一兩

大黃

三分

桂心

半兩

甘草

一分

右為細末每服二錢水一盞胭脂一小角子煎至六分去滓如躁時放冷服細呷清者

婦人血風攻脾不能食方論第七

凡四方

夫脾象於土脾為中州意智之藏也其肝心肺腎皆受脾之精氣以榮養焉脾與胃為表裏脾主化穀納食胃為水穀之海故經言四時皆以胃氣為本也婦人血氣

不調臟腑勞損風邪冷氣蘊蓄在內攻於脾胃脾胃既虛為邪所乘則不能摧伏五穀故令不能食也

草豆蔻散 治婦人血風冷氣攻脾胃嘔逆不納飲食

人參

一兩

草豆蔻仁

麴裏煨

白茯苓

半夏

各三分

良薑

白朮

縮砂仁

枇杷葉

去毛炙

桂心

木香

青

皮 甘草

各半兩

右為粗末每服三錢水一大盞薑三片煎至七分去

滓溫服無時候

神麴元 治婦人血風攻脾胃腹脇氣滿不思飲食

白朮

附子

炮

枳殼

製

訶子

桂心

人參

木

香

食茱萸

泡

陳皮

各一兩

苦梗

乾薑

各半兩

右為細末以酒煮神麴末二兩作糊為元如梧桐子大每服二十元空心薑湯吞下

椒紅元 治婦人血風攻脾胃臟腑虛冷全不思食臍腹多痛體瘦無力

椒紅

沉香

附子

炮

莪朮

訶子

當歸

白

術

各一兩

良薑

白豆蔻仁

丁香

各半兩

麝香

一分

右為細末酒煮麪糊員如梧桐子大空心溫酒下三

十元

進食散

李潛云治脾胃虛寒不思飲食及久病人脾

胃虛全不入食者只兩服能食

出蘇沈良方

據愚見此方既

有川烏治血風攻脾不食豈無良驗

青皮

陳皮

粉草

良薑

桂心

各一分

川烏

炮去

皮草豆蔻仁

各三箇

訶子

五箇

右為細末每服一錢水一盞薑二片煎至七分溫服

婦人夢與鬼交方論第八

凡三方

夫人稟五行秀氣而生承五藏神氣而養若陰陽調和則臟腑強盛風邪鬼魅不能傷之若攝理失節而血氣虛衰則風邪乘其虛鬼邪干其正然婦人與鬼交通者由臟腑虛神不守故鬼氣得為病也其狀不欲見人如有對晤時獨言笑或時悲泣是也脈息遲伏或如鳥啄皆鬼邪為病也又脈來綿綿不知度數而顏色不變此

亦是此候也

茯神散 治婦人風虛與鬼交通妄有所見聞言語雜

亂

茯神

一兩半

茯苓

人參

石菖蒲

各一兩

赤小豆

半兩

右㕮咀每服三大錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

桃仁元 治婦人與鬼魅交通

辰砂

檳榔

當歸

桃仁

各三分

水銀

一分

囊肉研令星盡

麝香

阿魏

麝香 煨

沉香

各半

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心桃仁湯吞下十元

又方 似辟瘟丹

虎頭骨

二兩 朱砂

雄黃

雌黃

鬼臼

皂莢

蕪荑仁

鬼箭

梨蘆

各一兩

右件生為末煉蜜為元如彈子大囊盛一元男左女右繫臂上及用一元當病人戶前燒之一切邪鬼不

敢近

太乙神精丹 蘇合香元皆可用也

婦人傷寒傷風方論第九 凡八方

論曰古人治病先論其所主男子調其氣婦人調其血
血室不蓄則二氣諧和血室凝結則水火相刑傷寒氣
口緊盛即宜下人迎緊盛即宜汗婦人左關浮緊不可
下當發其汗以救血室榮衛得和津液自通決然汗出
而解仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譫語

如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃
氣者言不可下也 小柴胡湯主之若行湯遲則熱入
胃令津燥中焦上焦不榮成血結胃狀須當針期門也
五行相尅以生相扶以出平居之日水常養於木木
相生則榮養血室血室不蓄則脾無蘊積脾無蘊積則
剛燥不生剛燥既生若犯胃氣則晝夜譫語喜忘小腹
滿小便利屬抵當湯證也

傷寒胃實譫語宜下之婦人
熱入血室譫語者不可下也

雖然婦人傷寒與男子治法不同男子先調氣婦人先

調血此大略之詞耳要知脈緊無汗名傷寒脈緩有汗為傷風熱病脈洪大中暑脈細弱其證一也假如中暈用白虎胃實用承氣豈必調血而後行湯邪仲景傷寒論所以不分婦人者良亦在學者皆可隨病於男子藥證中以意選用也 若妊婦傷寒藥性須涼慎不可行桂枝半夏桃仁等藥小柴胡去半夏名黃龍湯益為妊婦而去也大抵產前先安胎產後先補益次服傷寒藥若病稍退則止藥不可盡劑此為大法 黃帝問婦人

重身毒之奈何岐伯曰有故無殞亦無損也大積大聚其可犯衰其太半過其厄 男子婦人傷寒仲景治法別無異議比見民間有婦人傷寒方書稱仲景所撰而王叔和為之序以法考之間有可取疑非古方特假聖人之名以信其說於天下今取金匱玉函治婦人傷寒與俗方中可採者列為一卷雖不足以盡婦人傷寒之詳並可以百問中參用也

婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾經脈凝滯不

得往來宜桂枝紅花湯

桂枝

芍藥

甘草

三兩紅花二兩

右㕮咀每服五錢水一盞半薑四片棗二个煎至七分去滓溫服良久再服汗出而解

婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食黃芩芍藥湯療之
黃芩 白芍藥 白朮 生乾地黄

右各一兩㕮咀每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服寒則加生薑

婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不可下宜服當歸湯

柴胡

三兩

白朮

二兩

人參

甘草

赤芍藥

當歸

各一兩

兩五味子

木通

各半兩

右呖咀每服半兩水一盞半生薑四片棗二枚煎至八分去滓稍熱服

婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩躁譫語目赤毒氣閉塞不得通宜瀉心三黃湯

川大黃

鼠尾黃芩

鷹爪黃連

等分

右為粗末每服四錢水一盞煎至八分去滓溫服取微利如目赤睛疼宜加茯苓嫩竹葉瀉肝之餘氣

婦人傷寒差後猶有餘氣不去謂之遺熱宜乾地黃湯

乾地黃

兩一

大黃

黃連

黃芩

柴胡

白芍藥

甘草

各一兩半

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服取溽利汗出解

男子病新差婦人與之交合得病名曰陽易其證裏急腰胯及腹內痛身重宜燒裊散

用男子裊襠燒灰為末以水調方寸匕服即愈

婦人病未平復因有所動致熱氣上衝胷手足拘急搐搦如中風狀宜青竹茹湯

栝樓根

二兩 淡青竹茹半升

右以水二升半煮取一升二合去滓分作三服

婦人病未平復因有所動小腹急痛腰胯疼四肢不任

舉動無力發熱者宜當歸白朮湯

桂枝 白朮 當歸 甘草 芍藥 人參 黃

耆

各一分

生附子

一箇破作八片各一分

生薑

半兩

右以咀水三升煮取一升半去滓通口服一湯盞食頃再服溫覆微汗差

婦人熱入血室方論第十

凡五方

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦宜小柴胡湯

婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為
熱入血室其血必結故使如瘧狀宜服小柴胡湯

柴胡

八錢重

黃芩

人參

生乾地黄

甘草

各三錢重

半夏

二錢重

右咬咀每服五錢水盞半薑三片棗二枚煎至八分
去滓溫服

局方四物湯 不用熟地黄只用生乾地黄加北柴胡
等分煎服亦療此證

婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼宜服乾薑柴胡湯

柴胡

四兩桂枝半兩

枳椇根

二兩牡蠣

乾薑

甘草

各一兩

右呔咀每服五錢水殘半煎七分去滓溫服初服微煩再服汗出而愈

婦人傷寒血結胃膈揉而痛不可撫近宜海蛤散婦人血結胃法當針期門仲景無藥方此方疑非仲景然其

言有理姑存焉

海蛤 滑石

甘草

各二兩

芒硝

一兩

右為細末每服二錢雞子清調下小腸通利則胃膈
血散腫中血聚則小腸壅小腸既壅則腫中血不流
行宜此方小便利血數行更宜桂枝紅花湯發其汗
則愈

婦人傷風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身
涼和胃脇下滿如結胃狀譫語者此為熱入血室也當

刺期門穴隨其實而取之期門穴在乳直下筋骨近腹處是也凡婦人病法當刺期門不用行子午法恐纏藏膜引氣上但下針令病人吸五吸停針良久徐徐出針此是平瀉法也凡針期門必瀉勿補可肥人二寸瘦人寸半深也



婦人咳嗽方論第十一 凡九方

夫婦人咳嗽者由肌體虛外受於寒熱風濕所得也肺為四臟之華益內統諸臟之氣外合於皮毛若為寒熱風濕所傷邪氣自皮毛而入於肺中外皆傷故令咳也大抵治咳不可一槩治當以脈息辨之其脈浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澁者起於寒風者散之濕者燥之熱者涼之寒者溫之虛者補之未有不安者也

咳嗽用溫藥方論第十二

經曰微寒為嗽寒甚為腸辟古人立方治嗽未有不本於溫藥如乾薑桂心細辛之屬以寒氣入裏非辛甘不能發散以此準之未有不因寒而嗽也又曰熱在上焦因欬為肺痿又實則為肺癰虛則為肺痿此人其始或血不足或酒色滋味太過或因服利藥重亡津液燥氣內焚肺金受邪脈數發熱咳嗽膿血病至於此亦已危矣古人立方亦用溫藥如建中之屬今人但見發熱咳

嗽率用柴胡鱉甲門冬葶藶等藥旋踵受弊而不知非
可為深戒就使不可進以溫藥亦須妙以湯元委曲調
治無為鹵莽致傷人命

黃耆散 治虛中有熱咳嗽膿血口苦咽乾

黃耆四兩甘草二兩

右為細末湯點一二錢服日三 一方甘草一兩黃
耆六兩名黃耆六一湯只呖咀水煎服

蛤蚧元 治婦人咳嗽不止漸成勞氣宜服

蛤蚧

一對酥炙

紫苑

款冬花

鱉甲

炙貝母

去心皂莢

子仁

各一兩炒

杏仁

炒去皮尖一兩半

右為細末煉蜜員如梧桐子大每服二十元淡薑湯

吞下

含化元 昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺

勞服此安冠宗奭方

枇杷葉

去毛

桑白皮

款冬花

木通

紫苑

杏

仁各等分

大黃

減半

右為細末煉蜜元如櫻桃大食後夜卧含化一元

貝母湯

治諸嗽久不差

出本方

貝母

生薑汁浸半日

北五味子

黃芩

乾薑

熱者減半

陳皮

各一兩

半夏

桑白皮

桂心

北柴胡

熱者加一半各半兩

木香

甘草

各一分

右為粗末每服五錢水一錢半杏仁七箇去皮尖碎之生薑二片煎至七分去滓熱服黃師文云戊申冬有姓蔣者其妻積年嗽製此方授之一投而瘥以此

治諸嗽悉皆愈

定喘湯 治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上氣喘急
喉中涎聲胃滿氣逆坐臥不安飲食不下及治肺感寒
邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

半夏麴

炒

明阿膠

炒

甘草

各錢半

鴛粟殼

半兩製

北五

味子

桑白皮

麻黃

去節

人參

各一分

右㕮咀每服三大錢薑三片烏梅半箇煎至七分去

滓漸漸溫服食後臨臥服

方同和劑分兩加減不同有效

滄州李官人宅補肺湯

治狀同前

又名清金湯

鴛粟殼

二兩製

人參

粉草

各半兩

陳皮

茯苓

杏

仁製

白朮

明阿膠

炒

北五味子

桑白皮

薏

苡仁

紫蘇莖

各一兩

右㕮咀為末每服三大錢水殘半薑三片棗兩枚烏梅半箇煎至一殘臨卧溫服僕每用則無效遂加百合貝母去心半夏麴冬花各一兩服之良驗

金不換散

治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿

悶咳嗽涎盛腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽咳唾紅痰及遠年日近一切喘咳疾諸藥不效者並治之

鴛粟殼

半兩製

杏仁

製

甘草

各三錢

枳殼

四錢

右吹咀每服三錢水一盞半薑三片烏梅半箇煎至

八分食後臨卧漸漸熱服

許元林先生方乙卯年七月僕嘗治一婦人咳嗽不

已服諸藥無效漸成勞瘵求余診之六脈濡弱以愚考之此是血弱又因憂感太過而成斯疾合用當歸等藥治之必愈遂先用古今錄驗橘皮湯空心服蘇子降氣湯後用金釵煎熟地黃元當歸元調理得安又治一婦人時行感熱咳嗽遂用小柴胡湯去人參薑

棗只加北五味子煎服愈

古今錄驗橘皮湯 療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中
作聲上氣不得下頭痛方

陳皮 紫苑 麻黃去根杏仁製 當歸 桂心 甘

草 黃芩各等分

右呖咀每服五錢水琰半煎至一琰去滓熱服

勞嗽方論第十三 凡二方

經曰人感於寒則受病微則為咳甚則為泄為痛凡咳

嗽五臟六腑皆有之惟肺先受邪蓋肺主氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛故咳為肺病五臟則各以治時受邪六腑則又為五臟所移古人言肺病難愈而善卒死者肺為驕藏怕寒而惡熱故邪氣易傷而難治以其湯散逕過針灸不及故也十種咳嗽者肺咳心咳脾咳腎咳肝咳風咳寒咳支飲咳膽咳厥陰咳華佗所謂五嗽者冷嗽氣嗽燥嗽飲嗽邪嗽孫真人亦有方治寒毒注嗽者歷代方論著之甚詳惟今之所謂勞嗽者無所經

見意其華佗所謂邪嗽真人所謂注嗽者是也此病益
酒色過度勞極傷肺損動經絡其重者咯唾膿血輕者
時發時差又有因虛感邪惡之氣且傳注得之或先嘔
血而後嗽或先咳嗽漸就沈羸此則非特內損肺經又
挾邪惡傳症之氣所以特甚病之毒害無過此也真人
治注嗽通氣元方用蜈蚣四節又云夢與鬼交通及飲
食者全用蜈蚣外臺方四滿元治五嗽亦用蜈蚣遇世
名公能推原其旨意率用蛤蚧天靈蓋桃柳枝麝香丹

砂雄黃安息香之類以通神明之藥療之高出古人之意矣又肺中有蟲如蚕令人喉痒而咳嗽湯散逕過針

灸不及以藥含化蟲死即嗽止

見張銳方

深師四滿元療五嗽一上氣嗽二飲嗽三鰓嗽四冷

嗽五邪嗽

乾薑 桂心 躑躅花 芎藭 紫苑 芫花根

皮

各二分

蜈蚣

一枚去頭足炙

細辛

甘草

炙

鬼督郵

人

參

半夏

洗各一分

右十二味為細末煉蜜元如大豆許每服五元米飲
下日三未知加至七八元服此藥無不差忌羊肉錫
生葱生菜海藻松菜

古今錄驗四滿元 療五嗽一氣嗽二痺嗽三鰓嗽四
邪嗽五冷嗽悉療之方

蜈蚣

二枚
灸

芫花

根五
分熬

躑躅花

炒

乾薑

芎藭

桂

心

各四
分

人參

細辛

各二
分

右為末煉蜜元如梧桐子大米飲下一十元日三服

加至十五元忌生葱生菜

喘滿方論第十四

凡六方

夫喘之為病黃帝問岐伯岐伯對曰夜行則喘出於腎
淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘
出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨當是之時
勇者氣行則已怯者則著而為病也原疾之由雖曰皆
本於肺與氣然感外邪則有太陽證脈浮無汗而喘者
宜麻黃湯陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜

承氣湯若表邪未解誤服下利藥不止脈促喘而汗出者宜葛根黃連黃芩湯若微喘者桂枝厚朴杏子湯汗出而喘若無大熱者宜麻黃杏子甘草石膏湯若表邪未解心下停水發熱而喘或嘔者小青龍湯去麻黃加杏仁主之若陰證喘促者四肢逆冷脈息沈細或寸大尺小或六脈促疾或心下脹滿結硬或冷汗自出或大便頻數上氣喘促或咽喉不利者此是本氣極虛內外挾寒冷所致使陰寒內消陽氣得復則愈宜返陰丹主

之

已上方並見百問不復錄

僕且以大槩而言之諸藏相乘而喘者

以杏子散如感寒伏熱而喘者以華蓋散九寶湯若暴寒向火覆衣被過當傷熱肺實而喘促者其狀多有熱證宜洗心散冷水調服若因氣宇不調痰盛喘促者宜四七湯兼官局桔梗湯薑煎服若涎多而喘者宜千縉湯橘皮半夏湯若不得臥卧即喘者此由水氣逆行上乘於肺肺得水則浮而開使氣不得通流其脈沈大宜神秘湯肺之積名曰息責在右脅下大如杯令人洒淅

寒熱喘咳發癰疽宜棗膏元若上氣喘者神授湯若上
盛下弱而喘促者宜蘇子降氣湯吞黑錫丹若尊年之
人素來稟賦太厚不任熱藥者不可輕投丹劑及諸熱
藥但以秘傳降氣湯分心氣飲論之梗槩不出於此矣
若素有脚氣而喘者當作脚氣治之又有骨蒸勞喘自
有專門不敢濫及

神秘湯 治水氣乘肺而喘兼療支飲而喘

陳橘皮

洗去白

紫蘇葉

人參

桑白皮

生薑

分等

右呖咀每服半兩水煎去滓溫服

杏子散 治諸藏相乘喘急

杏仁

去皮尖雙仁麩炒黃細研如膏

麻黃根

為細末等分

右和煎橘皮湯調下二錢無時候

千縉湯

齊州半夏

七枚炮裂四片破之

皂角

去皮炙二寸

甘草

炙一寸

生薑

大如指

右同以水一椀煮去半頓服沈興宗待制嘗病痰喘

不能臥人扶而坐數日客有見之曰我曾如此得良藥一服差我以千緡酬之謂之千緡湯可試為之興宗得湯一服而差

棗膏元 療息賁

葶藶

研細

陳皮

苦梗

各等分

右後二味為末入葶藶令停煮肥棗肉研為膏和圓如梧子大每服五七丸飲下 許學士云予嘗患停飲水積肺經食已必噎漸喘覺肺系急服此良驗

神授湯 治上氣喘急不得卧

橘紅 苦梗 紫蘇 人參 北五味子等分

右咬咀每服四錢水一錢煎至六分去滓食後服

九寶湯 治感風伏熱一切咳嗽喘急不問高年小兒
室女產前產後皆可服惟虛勞自汗不可服

薄荷葉 紫蘇 大腹皮洗 麻黃去根節各四錢 桑白皮

桂心 杏仁去皮尖 陳橘皮 甘草各二兩

右咬咀每服半兩水一錢半薑十片烏梅一箇煎至

六分去滓溫服食後 有兩浙張大夫病喘二十年
每至秋冬輒劇不可坐卧百方不差後得臨平僧法
本方服之遂差法本凡病三十年服此藥半年乃絕
根本永不復發凡服此藥須久乃差

官局桔梗湯

橘皮半夏湯

洗心散

華蓋散

並見局方

不復發

四七湯

見本卷二十卷

僕嘗療羅安人年近六十遇秋

冬之交上氣喘促不能坐卧六脈洪實服諸藥無效問
疾之原少年自川中任所服餌丹砂又恐是丹毒為害

遂服洗心散無效僕以華蓋散數服而愈謾記之

婦人風痰方論第十五 凡八方

夫婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於胸膈所成也人皆有痰少者不能為妨多者成患但胸膈有痰飲漬於五臟則令眼暈亦令頭眩頭痛也

評曰夫痰之為害多因外感五邪

五邪者寒暑燥濕風

內傷七

氣

七氣者喜怒憂思驚恐志

因五邪而得者得風為風痰得寒為

寒痰得冷為冷痰得熱為熱痰得暑為暑痰因七氣

所傷者多因婦人性情執著不能容忍而有此證豈特只因風冷而成哉所以外感五邪內傷七氣則一身之中血液淚汗涕唾身中濕者敗濁變而成痰乘間而為害也經云清則運為精華濁則凝為痰飲此之謂也然有痰涎飲沫四種相類宜仔細詳辯調治因風而生痰者宜服三生飲星香飲青州白元子化痰元

方見局方

因寒冷而得者宜服降氣湯黑錫丹養正

丹

並見局方

因熱而得者宜服金沸草散柴胡半夏湯因

暑而得者消暑元

並見局方

因氣宇不調鬱結而成者宜

服參蘇飲四七湯二陳湯痰在上者以瓜蒂散吐之

在下者以控涎丹利之雖曰可吐可下亦要觀人之
勇怯察脈之虛實方可投之切記不宜痛擊暴下所
以初虞世有金虎碧霞之戒者此也

三生飲 星香飲

參蘇飲

方並見第三卷第一論

控涎丹

方見第三卷第六論

養正丹

方見第四卷第四論

旋覆花湯 治婦人風痰嘔逆不下飲食頭目昏悶

旋覆花

去蒂 枇杷葉

去毛

川芎

北細辛

藿香

桂心

枳殼

去穰
麩炒

前胡

人參

去蘆

羌活

半夏

各半兩

甘草

羚羊角

屑

赤茯苓

各三分

右為粗末每服三錢水一椀薑三片煎至七分去滓

溫服

天南星元 治婦人風痰心膈壅滯

天南星

白附子

並炮

皂莢仁

炒黃

半夏麴

各一兩

晉礬

半兩
枯

右為細末以酒煮麴糊圓如梧桐子大每服十元生薑薄荷湯吞下

又方

半夏

天南星

各二兩

肥皂莢

五挺

生薑

三兩

右以水五升一同煮令水盡去皂莢生薑只用半夏南星焙乾為末以酒煮麴糊圓如梧桐子大生薑薄荷湯下七元

柴胡半夏湯

治痰熱頭痛利膈除煩悶手足煩熱榮

衛不調肢節拘攣身體疼痛嗜卧少力飲食無味兼治
五嗽痰癖

柴胡

八兩

半夏

三兩

人參

去蘆

甘草

黃芩

麥門冬

各三兩

白朮

二兩

右呔咀每服五錢水琰半薑五片棗一枚煎至八分
去滓服

金沸草散 治傷寒中脘有痰令人壯熱頭痛筋緊急
時發寒熱皆類傷風

荆芥穗

四兩

半夏

甘草

北細辛

各一兩

赤茯苓

二兩

前胡

旋覆花

各三兩

右為細末每服二錢水一盞生薑五片棗一枚煎至

六分熱服未知再服

局方有麻黃赤芍藥無細辛茯苓

瓜蒂散 療病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸

中痞鞭氣上衝喉咽不得息者此為胸中有痰也當吐

之宜服此

瓜蒂

炒黃

赤小豆

各半兩

右為細末取一錢匕豉一合湯七合先漬之須臾煮
作稀糜去滓取汁和散溫頓服不吐少少加得快吐
乃止諸亡血虛家不可與之

脈微大忌
令人吐

大半夏湯 治痰飲及脾胃不和

半夏 白茯苓 生薑

各一分

右咬咀作一服每遇膈間有寒痰以水二錢煎至一
錢去滓臨卧溫呷如有熱痰加炙甘草一分如脾胃
不和去甘草加陳橘皮一分同煎此即二陳湯加減

得理

四七湯 治喜怒悲思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七氣所為也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之 婦人性情執着不能寬解多被七氣所傷遂致氣填胸臆或如梅核上塞咽喉甚者滿悶欲絕產婦尤多此證宜服此劑間以香附子藥久服取效切不可謂紫蘇耗氣且謂新產氣血俱

虛不肯多服用之效驗不可具述

紫蘇葉

二兩

厚朴

三兩

茯苓

四兩

半夏

五兩

右咬咀每服四錢水一椀半薑七片棗一箇煎至六分去滓熱服無時候若因思憂過當小便白濁用此藥吞青州白元子極妙

婦人心胸嘈雜方論第十六

凡二方

夫心胸嘈雜婦人多有此證原疾之由多是痰也皆血液淚汗變成或云是血嘈今人多用猪餘血炒而食之

則愈詳其此理是以血導血歸原爾恰如以鹽梅下涎之義不若用許學士旋覆花湯治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多睡口中清水自出脇肋急脹滿痛不欲食此胃氣虛冷所致其脈沉遲弦細是其證也旋覆花湯方

旋覆花 北細辛 橘紅 桂心 人參 甘草

苦梗 白芍藥 半夏

各半兩


赤茯苓

三分

右㕮咀每服四錢水棧半薑七片煎至八分去滓溫

服

局方治惡阻半夏茯苓湯亦妙方見惡阻論中



婦人大全良方卷六

望安遍尋諸方皆無對證之藥遂處四白散子與服
不半劑熱退能食又處蒼朮負繩之筋脉伸足能行
而愈

大便秘者可與七宣員神功員七聖檳榔員三和散服

之効

諸方並見
和劑方

婦人大全良方卷四

欽定四庫全書

婦人大全良方卷五

宋 陳自明 撰

勞瘵叙論第一

凡二十一方

夫骨蒸殭殍復連尸症勞瘵虫瘵毒瘵熱瘵冷瘵食瘵
鬼瘵等皆曰傳尸以瘵者注也病自上注下與前人相
似故曰瘵其變有二十二種或三十六種或九十九種
大畧令人寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁髮乾而聳或

腹中有塊或腦後兩邊有小結核連復數箇或聚或散
沉沉默默咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或復下
利羸瘦困乏不自勝持積月累年以致於死死後乃症
易傍人乃至臧門者是也更有蜚尸遁尸寒尸喪尸尸
注等謂之五尸及大小附着等證不知其所苦無處
不惡乃挾諸鬼邪而害人以三因攷之內非七情所忤
外非四氣所襲雖若麗乎不內外因奈其證多端傳變
遷移難以推測故自古及今愈此病者十不得一所謂

狸骨獺肝天靈蓋銅鑑鼻徒有其說未嘗見效唯膏肓
俞崔氏穴名四花有六穴若聞早灸之可否幾半晚亦
不濟也 病者增寒發熱自汗面白目乾口苦精神不
守恐畏不能獨卧其傳在肝 病者增寒發熱面黑鼻
燥忽忽喜忘大便苦難或復泄瀉口瘡其傳在心 病
者增寒發熱面青唇黃舌本強不能嚥飲食無味四肢
羸瘦吐涎沫其傳在脾 病者增寒發熱面赤鼻白乾
燥毛折咯嗽喘急時吐白涎或有血線其傳在肺 病

者增寒發熱面黃耳輪焦枯脰骨痠痛小便白濁遺瀝
胸痛其傳在腎

二十四種蒸病論

所謂勞蒸者二十四種隨證皆可考尋毛折髮焦肌膚
甲錯其蒸在皮 外人覺熱自反惡寒身振濶劇其蒸
在內 髮焦鼻衄或復尿血其蒸在血 身熱煩躁痛
如針刺其蒸在脉 爪甲焦枯眼昏兩脇急痛其蒸在
筋 版齒黑燥大杼酸痛其蒸在骨 背脊疼痛脰骨

酸癰其蒸在髓 頭眩熱悶口吐濁涎眼多眵淚其蒸
在腦 男子失精女子白淫其蒸在玉房 乍寒乍熱
中脘與臆中煩悶其蒸在三焦 小便赤黃凝濁如膏
其蒸在膀胱 傳道不均或秘或泄腹中雷鳴其蒸在
小腸 大腹隱痛右鼻乾疼其蒸在大腸 口鼻乾燥
腹脹睡卧不安白汗出其蒸在胃 口苦耳聾脇下痛
其蒸在膽 裏急後重肛門澁秘其蒸在回腸 小腹
疔痛筋脉縱緩陰器自強其蒸在宗筋 眼昏淚下時

復眩暈躁怒不常其蒸在肝 舌焦黑氣短煩悶洒洒
淅淅其蒸在心 唇乾口瘡胃腹脹悶畏寒不食其蒸
在脾 咳嗽喘滿咯痰吐血聲嘶音遠其蒸在肺 耳
輪焦枯脚氣酸疼起居不得其蒸在腎 情想不寧無
故泄精白物綿綿而下其蒸在右腎 心主胞絡心膈
噎塞攻擊疼痛俛仰煩冤其蒸在膈諸證雖曰不同其
根多有虫嚙其心肺治之不可不絕其根也

神仙秘法 取傳尸勞虫服此藥須先擇良日焚香禱

祝令病人設榻面向福德方服即有神效不可使病人知其藥味及子細

青桑皮

楊柳枝

梅枝

桃枝

已上要取東引者各七莖

葱白

七莖

以子代無

真安息香

一分研

阿魏一分

右八味除阿魏外用童子小便一升半煮取藥耗及一半去滓將藥汁化阿魏再煮十數沸去滓候溫作

貳次調下件藥末

朱砂

半兩

小檳榔

半兩

麝香

半分

右三味研令極細分為二服用前湯使調下五更初
一服三點再一服辰時間取下虫遂絕根本若見虫
色白者此病必差若黑色則已傳入腎經不可救也
服藥後只以淡粥補之並不動元氣効驗無比切須
秘之世傳勞虫有靈輕易傳之則傷醫者此說殆醫
者祕惜其方不可以授人耳要須密重之則無洩慢
天機乃起死還生功同造化鬼神護助自有靈効大
凡傳屍勞者必須先服此一藥後十五方隨證治不

可以槩用藥調治三五箇月再服此取虫藥則永除
根本如取下虫色已黑縱服後藥亦無補也然亦能
使不傳它人

治心胃積氣作胃痺引兩脇痛昏悶不收音聲不清虛
熱上壅作鼻衄方

桑白皮

分三枳殼

木通

子芩

生乾地黄

白

芍藥

甘草

各半兩

右為粗末每服三錢重水浸半煎至七分去滓溫服

食後

治伏瘀血在心肺時作衄心胃徹背痛方

白芍藥

牡丹皮

各一兩

生犀屑

半兩生地黃

三兩別槌碎入

右咬咀每服半兩水一大錢煎至七分去滓溫服

調榮衛消瘀血出聲音治痰嗽方

川當歸

牡丹皮

白芍藥

子芩

木通

麥

門冬

甘草

華陰細辛

各半兩

生乾地黃

一兩

右咬咀每服三錢水一錢薑三片煎至七分去滓溫

服

治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血雞蘇圓

雞蘇葉

半斤

黃耆

半兩

甘草

川芎

各一分

防風

一分

苦梗

半兩荆芥穗

一分甘菊花

一分真腦子

半錢生乾地黃

半兩

兩

右為細末煉蜜圓如彈子大每服一圓用麥門冬去

心煎湯嚙下又治肺損吐血日漸乏力瘦弱行步不

得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前

子一分每服一圓煎桑枝湯嚙下日可六七服桑枝

劉炒香每用水三錢煎至一錢去滓下藥

治勞氣食後身疼倦夜間盜汗此病因失血榮衛損也

宜防風湯方

黃耆一兩白芍藥

防風

各三分

甘草半兩當歸

生乾

地黃

各三分

右咬咀每服三錢水一錢薑三片棗一箇煎至七分

去滓溫服食前服

治勞嗽溫金散

甘草 黃芩 桑白皮 防風 各一兩 杏仁 二十七粒製

人參 去蘆 茯神 各半兩 麥門冬 一分

以前五味用米泔浸一宿曬乾次入人參茯神麥門冬三味同為細末每服二錢水一錢蠟一豆大煎至八分食後溫服

治勞嗽有四滿員極妙 方見勞嗽門

治心氣不足解勞倦益血桔梗飲子

苦梗 甘草 黃耆 人參 去蘆 麥門冬 各一兩 青皮

半兩

右為末每服二錢水一錢煎至七分溫服

治胃痺瓜樓湯

枳殼四箇厚朴

薤白各一兩

瓜樓一箇桂枝一兩有熱除此一味

右咬咀水七升煎取四升去滓溫服

涼心肺解勞除熱使榮衛順血不絕子苓散

黃耆

一兩

白芍藥

子苓

人參

白茯苓

麥門

冬

苦梗

生乾地黄

各半兩

右為粗末先用竹葉一握小麥七十粒水三錢薑三片煎至水一錢半入藥末三錢重煎至七分去滓溫服

治積氣堅硬作氣噎胃脅引背痛方

白芍藥

一兩半

鱉甲

醋炙

枳殼

去穰麩炒

北柴胡

各一兩

甘草

赤茯苓

各半兩

右咬咀每服三錢水一大盞薑三片棗一箇煎至七分去滓溫服

治伏連傳注腹中有堅硬積氣壅心胃作痺痛引脇背
痛腕膈滿悶方

鬼臼

天門冬

去心各三分

巴豆

一分去皮心炒

莽草

不蛀

皂角

酥炙各半兩

葉子雄黃

一兩

右為細末煉蜜為圓如小豆大每服一圓漸加至三
二圓空心湯水吞下臨卧一服常宜斟酌勿令泄瀉
忌鯉魚山猪蘆笋

出聲音方

訶子

炮去核

木通

各一兩

甘草

半兩

右咬咀用水三升煎至升半入生地黃汁一合再煎數沸放溫分六服食後日作半料

治咽喉痛方

百藥煎

去黑皮

鵬砂

甘草

生白礬

等分

右四味為細末每服一錢食後米飲調細細呷嚥

治肺間邪氣胃中積血作痛失音含化圓方

蛤蚧

一雙去口足炙

訶子

去核

阿膠

粉炒

麥門冬

去心

北細辛

甘草 生乾地黄

各半兩

右為細末煉蜜為圓如雞頭子大食後含化一圓

已上諸方辰州李倅名景適錄示云傳之於五羊大

帥方侍郎

上務下德

治療疾得效方河車圓 治勞嗽一切勞瘵虛損骨蒸

等疾

河車一枚

初生男子者尤良於長流水中蕩洗盡血淨入鍋內煮熟以手擘成小片焙乾

須在一日內便碾成末纔經宿即不乾碾不成末矣按本草云人肉治療病胞衣飄生者尤佳主血

氣羸瘦婦人勞損面黥皮黑腹內諸疾漸漸瘦悴者以五味和之如鮠鉀法與服之勿令病者知亦治天行熱癘立效胞衣埋地中七八年化成水澄清如真水南方之人以甘草升麻和諸藥釀盛埋之三五五年揆雪白茯苓兩揀參一兩乾山藥二兩此為藥服

右為細末麪糊為圓如梧桐子大以少麝香末為衣每服三五十圓米飲溫酒鹽湯送下空心服嗽甚者五味子湯下

又方治肌瘦咯血肺痿等疾

蛤蚧

一雙全者酒浸一宿酥炙

知母

貝母

去心

人參

去蘆

甘草

杏仁

去皮尖
麩炒

枇杷葉

去毛
炒

鹿角膠

粉炒

右各一兩依方事治淨秤為末每服三錢水一錢入

桑白皮煎至八分溫服日三夜二

治勞嗽補肺湯

桑白皮

熟地黃

各二兩

人參

去蘆

紫苑

黃耆

川

五味子

各一兩

右為細末每服二錢水一錢煎至七分入蜜少許食

後溫服

又四君子湯加秦艽黃蠟煎服尤妙

辰陽李倅云已上藥方乃趙世則傲之次子公璵並服此乃安傳之仲弟屢救人甚驗服藥止可食淡煮猪蹄肉仍須先煮熟肉去元汁再以白湯熟煮仍忌房勞一切生冷魚腥鹹毒醃藏等物無不痊愈修合藥及煎藥時忌生人孝子婦人雞犬猫畜見仍勿令病人知用藥味大有功效

治傳尸出汗取虫辟邪養正膏

鼈甲

一兩醋炙

青蒿

一握

淡豉

三七粒

葱白

兩莖

安息香

一分研

桃柳桑枝

各七莖

桃仁

四十九箇去皮尖雙仁

天靈蓋

用七頭大一片

酥炙

右十味隔夜以水一升浸至五更煎至半升再以童便半升同煎取四合又用檳榔一箇為末麝香一錢匕將所煎藥去滓調下至日高二丈時放溫頓服以衣覆出汗審看十指汗出如藕絲五色臭穢汗出後仍瀉下虫狀惡物盡者旬日再服永效

猪肚元 治骨蒸勞唇頰赤氣粗口乾遍身壯熱或多虛汗大腸澀秘小便赤黃飲食全少

出博濟方

青蒿 鼈甲

醋炙

北柴胡

木香

生乾地黃

各一兩

青皮半兩宣黃連二兩

右為末以猪肚一箇洗淨入藥在內繫定蒸令極軟
研如泥為圓如綠豆大湯下十五元空心日三服忌
濕麪毒物

婦人骨蒸勞方論第二凡十五方

夫骨蒸勞者由熱毒氣附骨故謂之骨蒸也亦曰傳尸
亦謂殭殍亦稱復連亦名無辜丈夫以瘰癧為根女人
以血氣為本無問少長多染此病內既傷於臟腑外則

損於肌膚日久不痊遂至羸瘦因服冷藥過度則傷於脾脾氣既衰而傳五臟脾初受病或脹或妨遂加洩痢肌肉瘦瘠轉增痿黃四肢無力飲食少味脾既受已次傳於腎腎既受病時時盜汗腰膝冷疼夢鬼交侵小便赤黃腎既受已次傳於心心既受病往往忪悸或喜或嗔兩頰常赤唇色如朱乍熱乍寒神氣不守心既受已次傳於肺肺既受病胃滿短氣咳嗽多唾皮膚甲錯狀如麤片肺既受已次傳於肝肝既受病兩目昏暗脇下

妨痛不欲見人常懷忿怒五臟既病漸漸羸瘦即難療也

天靈蓋散 治婦人骨蒸勞四肢無力每至晚間即熱兩頰紅色食飲不下心神煩躁

天靈蓋炙酥安息香地骨皮當歸山梔子仁

人參去蘆貝母去心黃連桃仁去皮尖雙仁麩炒黃檳榔各一兩

鼈甲炙醋北柴胡生乾地黃赤茯苓麥門冬

各一兩半阿魏

右為粗末以童子小便一大瓊桃柳枝各七寸薑五片蔥白五寸藥四錢煎至七分去滓溫服

獺肝元 治婦人骨蒸勞熱體瘦煩疼不欲飲食

獺肝一具 鼈甲醋炙 北柴胡各兩半 朱砂 桃仁去皮尖雙仁麩

黃炒川升麻 天靈蓋酥炙 犀角屑 梔子仁 地骨

皮 知母各一兩 黃耆三分 甘草半兩 麝香一分研

右為細末煉蜜負如梧桐子大溫水下三十負無時候

黃耆元 治婦人骨蒸煩熱四肢羸瘦疼痛口乾心躁
不得眠卧

黃耆 麥門冬去心 茯神 北柴胡 甘草 生乾

地黃各一兩 酸棗仁炒 郁李仁 杏仁去皮尖雙 黃柏

杞子 人參去蘆 黃芩各三分 百合 枳殼去穰 赤芍

藥 知母各半兩 鼈甲二兩製

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大清粥吞下三十丸

無時候

煞鬼負

治婦人骨蒸傳尸勞瘦鬼氣伏連

已上出聖惠方

麝香

三分

犀角屑

木香

白朮

各一兩

鬼箭羽

虎

頭骨

酥炙

天靈蓋

酥炙

辰砂

桃仁

去皮尖雙仁麩炒黃

雄黃

各兩

半

右為細末煉蜜為負如梧桐子大溫水下二十負此藥亦辟瘟疫亦可帶之

鼈甲煎

治勞

見專治婦人方

雄鼈

一個重一斤者

杏仁

去皮尖雙仁炒

北柴胡

貝母

去心

知母

各四
兩

右除鼈外諸藥細剉以好酒五升入鍋內將活鼈在
中以藥和停圍定上用板子石壓定令鼈在藥內喫
酒藥候來日却以慢火煮候酒盡為度却取鼈令患
人喫盡次將鼈甲用醋炙黃入在前項諸藥內焙乾
為細末用酒煮麴糊元如梧桐子大用米飲吞下三
十元無時候日五服

麥煎散 治少男室女骨蒸婦人血風攻症四肢心胃

煩壅

赤茯苓

當歸

乾漆

生鼈甲

醋炙

常山

大黃

煨

北柴胡

白朮

生乾地黄

石膏

各一兩

甘草

半兩

右為細末每服二錢水一錢小麥五十粒煎至六分
食後臨卧時溫服有虛汗加麻黃根一兩蘇東坡云
此黃州吳判官方療骨蒸黃瘦口臭肌熱盜汗極效
麥煎散甚多此方吳君寶之如希世之珍其效可知
筒骨煎 治諸虛勞疾羸瘦乏力腰背引痛心煩喘嗽

唾膿嘔血頑涎壅盛睡卧有妨胃滿氣促夜多盜汗髮焦耳鳴皮寒骨熱一切五勞七傷骨蒸等候並皆療治

許元林
先生方

地骨皮 粉草 北柴胡 前胡 烏藥 麻黃

不去節 乾葛 青蒿 苦梗 知母 天仙藤 北

黃芩 各一人參 生乾地黃 秦艽 鼈甲 黃

耆 各半兩

右咬咀每服三錢水一錢酒一分猪筒骨一莖炙焦

分為四服桃柳枝各七寸杏仁五粒去皮尖槌碎煎至七分去滓溫服加烏梅半箇尤妙

一方加當歸白芍藥

華佗方大靈治傳尸明月丹方

雄黃

木香

各半兩

天靈蓋

炙一兩

輕粉

一分

鼈甲

醋炙一兩

兔屎

二兩

右為末用法酒一大升大黃半兩為末熬膏入前藥為元如彈子大朱砂為衣傳尸勞肌瘦面黃嘔吐咳嗽不定先燒安息香令烟出吸之不嗽非傳尸也不

可用此藥若烟入口咳不能禁止乃傳尸也宜用此藥五更初服勿令人知以童便共酒一錢化一元服如人行十里久必吐出虫狀如燈心細長及寸或如爛瓜李又如蝦蟇狀各不同未效次日再服以應為度

蘓沈良方治諸勞明月丹

兔糞

四十枚

硃砂

如兔屎大
四十枚

石細研生蜜元如梧桐子大以甘草半兩碎之水浸

一宿取汁五更初下七元勿令病人知勞藥下後頻
看若有虫急打殺以桑火油煎使焦棄急水中三日
不下更服須在月望前日服忌見喪服色衣婦人猫

犬之類後服治勞補氣藥取差

沈內翰云威愍孫元規藏此方數能活人

江陰萬融病勞四體如焚垂困一夜夢人腹墜一月
如大盤明爛不可正視逼人心中骨皆寒已而悸寤俄
頃扣關乃威愍使人遺之藥服之遂差問其名則明
月丹也始悟向之所夢大體此藥最治熱勞又云傷
寒煩躁骨熱皆能治

療一方有鵝砂等分

鮮勞生肌進食活血養心地黃煎元

有人云甚妙

華佗方

生地黄汁 杏仁汁 生薑汁 藕汁各五升 薄荷

汁 鵝梨汁各一升 法酒二升 沙蜜四升

右慢火熬成膏入後藥

北柴胡去蘆三兩 木香 人參 茯苓 山藥 栢子

仁去皮炒研 遠志去心 枳實去穰炒 白朮各一兩 秦艽 苦梗

並去蘆各二兩 麝香半兩研 熟地黄洗焙酒蒸四兩

右為末以前膏子和勻如梧桐子大食後甘草湯下

二十元

治骨蒸寒熱名醫錄云睦州楊寺丞有女事鄭迪功女有骨蒸肉熱之病時發外寒寒過內熱附骨蒸盛之時四肢微瘦足跌腫者其病在五臟六腑之中衆醫不瘥因遇處州吳醫看曰請為治之只單用石膏散服之體微涼如故

石膏散方

見靈苑方

真石膏

不以多少研令極細

石新汲水和服方寸匕取身無熱為度

外臺秘要本草同

青蒿散

治男子婦人肢體倦疼虛勞寒熱

靈苑方

青蒿八九月間成實時採去枝梗以蒿用童子小便浸三日燉乾為末每服二錢烏梅一箇煎至七分溫服

青蒿鼈甲煎元

治骨蒸勞退熱解肌進食

出博濟方

九肋鼈甲

一箇北柴胡

二兩甘草

杏仁

桔梗

當

歸人參

地骨皮

赤芍藥

各一兩

胡黃連

宣

連

各一分

官桂

木香

各半兩

麝香

一字

酥

蜜

各三兩

右十四味同為細末用青蒿一斤童子小便五升好酒一升熬青蒿汁約二升已來攪去青蒿不用入酥蜜再熬成膏冷後入藥末搜和為元如梧桐子大每服十五元溫酒下米飲亦得日進三服如秋後合時更入桃柳枝七莖此藥甚妙

五心煩熱附

五心煩熱頰赤宜局方逍遙散秦艽散

方見第六卷第一論

逍遙散 治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重

心忪顙赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏
月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又療室女血弱陰虛榮
衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

白茯苓

白朮

當歸

去蘆酒浸
半日微炒

白芍藥

北柴

胡

去苗各
一兩

甘草

炙兩
半

右咬咀每服三錢水一盞煨生薑一塊切片薄荷三
葉同煎至七分去滓熱服無時候

枳殼散

治婦人手足煩熱夜卧多汗肌肉黃瘁經候

不調四肢煩倦心胃滿悶狀如勞氣

枳殼

去穰麤炒二兩

半夏麴

赤芍藥

各一兩

柴胡

黃芩

各一兩半

右為細末每服二錢水一錢生薑一塊擘破棗二枚煎至八分去滓溫服候五心煩熱及身體壯熱潮熱退方續服

婦人血風勞氣方論第三

凡十四方

夫婦人血風勞者由氣血虛損經候不調或外傷風邪

或內挾宿冷致使陰陽不和經絡否澁腹中堅痛四肢
酸疼月水或斷或來面色萎黃羸瘦又有因產後未滿
百日不謹將護臟腑虛損百脉枯竭遂致勞損之疾也
人參荊芥散 治婦人血風勞氣身體疼痛頭昏目澁
心忪煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胃滿精神不爽或
月水不調臍腹疔痛瘰癧塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲
食不進或因產將理失節淹延瘦瘁乍起乍卧甚即着
床

荊芥穗 人參 桂心 生乾地黄 北柴胡

鼈甲

醋炙

酸棗仁

炒

枳殼

製

羚羊角屑

別為末

白朮

各七

錢半 川芎

當歸

防風

甘草

各半兩

右為粗末每服三錢水一錢半生薑三片煎至八分
去滓熱服無時候日二服常服除一切風虛勞冷宿
疾孕婦休服

鼈甲元 治婦人血風勞氣四肢羸瘦疼痛經脉不利
飲食無味漸加虛困

鼈甲 紫苑 桂心 川芎 防風 川牛膝

當歸 秦艽 人參 桃仁 琥珀 各一兩 麝香 一分

黃耆 赤芍藥 蟲虫 製 水蛭 製 鬼箭羽 白朮

羌活 各三分 熟乾地黄 兩半

右為細末煉蜜元如梧桐子大食前溫酒吞下三十元

琥珀元 治血風虛勞上熱下冷或發動即心中煩燥困乏無力不美飲食醋心口瘡月水不調肌肉黃痒腹

痛腸鳴或有氣塊攻衝或時作寒熱頭旋痰逆手足麻痺大宜常服出博濟方

琥珀 當歸 木香 川芎 防風 檳榔各四分

三稜炮 乾薑炮 桂心各五分 吳白朮洗 柴胡 人參

各二分 青皮 吳茱萸洗泡炒黑 全蝎炒 附子炮 草豆蔻

赤芍藥 柏葉 白芷各三分 桃仁去皮尖炒 敗龜醋炙

鼈甲各六分 天麻三分

右為細末煉蜜元如梧桐子大每日空心酒下二十

元午前近晚更進一服如覺煖近晚不須服如腹內塊積攻築於鼈甲桃仁檳榔三稜各加一倍為妙忌生冷葱薤菜毒魚等物

香甲散 治婦人血氣虛勞四肢少力肌肉黃痒多困減食遍身痠疼真邪相擊心腹撮疼

木香 乾薑

各三分

鼈甲

醋炙二兩

牡丹皮

赤芍藥

橘紅 桂心 人參 茯苓 熟地黃 秦艽

柴胡

白朮

炒

當歸

炒

附子

炮去皮

甘草

半兩

右為粗末每服二錢水一錢生薑三片棗二枚煎至七分去滓稍熱服如煩渴心躁入烏梅一兩同杵為末

地黃煎 治婦人血風勞心忪發熱不退 出經驗方

生乾地黃 熟乾地黃

右二味等分為細末用生薑自然汁入水相和打糊為元如梧桐子大每服三十元用地黃湯下或只茶酒醋湯下亦可食後日三服覺臟腑虛冷早間先服

八味員一服

不可謂地黃性冷沮如壞脾大槩陰虛則發熱蓋地黃大能補陰精血也

荊芥散

治血風諸般疾產後並宜服食久服諸疾除

去

荊芥

雀腦芎

各三兩

當歸

人參

各半兩

桂心

牡

丹皮

羌活

防風

苦梗

大腹子

甘草

蒲黃

白茯苓

枳殼

厚朴

半夏

杏仁

款冬花

各三分

附子

炮

乾地黃

鼈甲

白芍藥

北柴胡

黃耆

各一兩

乾薑

木香

各半分

沉香

一分

右為細末每服二錢薑三片棗一枚水一錢煎至七分溫服

荊芥煮散 治婦人血海虛冷手足煩疼頰赤口乾背甲勞倦寒熱往來咳嗽痰涎飲食進退血經不調多驚盜汗胃膈不快但是風勞氣冷並皆治之

荊芥穗

兩四

北柴胡

秦艽

白芷

黃耆

各二兩

當歸

歸 莪 茂

川芎

麥門冬

白茯苓

人參

白芍藥

沉香

海桐皮

枳殼

熟地黃

甘

草 酸棗仁 木香 檳榔 各一兩 鼈甲 製 白豆蔻

桂心 苦梗 各二兩

右為細末每服二錢生薑三片烏梅一箇煎至七分
無時溫服如極虛去檳榔每日兩服臨卧服尤佳忌
生冷動風甜物腹有顆塊服之便消

如聖散 治婦人所稟血氣不足不耐寒暑易冒疾傷
月水不調久而心虛狀若心勞四肢易倦筋骨少力盜
汗易驚或時不寧五心煩熱肌膚不長間作頭昏飲食

無味胃膈不利或產前產後受病並可服之

北柴胡 白茯苓 甘草 熟地黄 人參 當

歸

各一兩

鼈甲

胡黃連

沉香

知母

各半兩

桑寄

生

乾葛

各三分

右為細末每服二錢水一錢烏梅一箇棗二枚麥門冬數粒煎至八分無時候

乞力伽散 治血虛肌熱又治小兒脾虛蒸熱羸瘦不能飲食

白朮 白茯苓 白芍藥

各一兩半

右為細末薑棗煎二錢服

油煎散 治血虛寒熱四肢酸倦無力瘦瘁不進飲食
日三服

川烏 海桐皮 地骨皮 五加皮 桂心 牡

丹皮 陳橘皮 白芍藥 川芎 當歸 烏藥

白芷 莢茂

等分

右為末每服二錢水二錢入生麻油三四點煎至七

分溫服無時候

大效油煎散 治血風勞氣攻症四肢腰背疼痛嘔逆
醋心不思飲食日漸羸瘦面色痿黃手足麻痺血海冷
敗服此神效

五加皮 川烏炮 芍藥 海桐皮 牡丹皮各一兩

桂心 乾薑 川芎各半兩

右為細末每服二錢水一錢油浸錢一文同煎至六
分溫服常服以油浸二錢煎藥時不可攪喫藥時不

可吹

局方亦有油煎散

方見和劑

四白散子亦妙

見四卷第九論

治血風勞方

牡丹皮 地骨皮 防風 甘草 黑豆 白芷

白芍藥

各一兩 荆芥穗二兩 川芎一分

右為細末每服二錢水一錢薑三片棗一箇葱白一寸煎至八分溫服無時候

香甲散 治熱病後虛勞或四肢倦怠脚手疼痛飲食

無味肌膚黃瘦或熱瘡盜汗頭暈虛煩此藥久服駐顏
其妙不可具述

鼈甲

三兩醋浸去裙炙黃
又入醋煎炙七次

當歸

木香

人參

羌活 川芎

沉香

肉豆蔻

酸棗仁

附子

檳榔

大腹子

各半兩

北柴胡

兩半

厚朴

川牛膝

白茯苓

秦艽

各兩

桂心

兩半

右咬咀每服五錢水一錢生薑三片烏梅一箇煎至
八分去滓溫服日三服空心忌生冷麪食雞肉鮓醬

之類

馬鞭草散

治血風攻透肢體疼痛或覺癢痒或覺痺

麻作寒作熱飲食減味並皆治之

已上出專治婦人方

馬鞭草

去粗梗

荆芥穗

北柴胡

烏梅肉

各二兩

枳

殼

白朮

羌活

白芍藥

各一兩

秦艽

天台烏

藥

麻黃

各兩半

木香

半兩當歸

川烏

炮

甘草

各一兩

右為細末每服二錢水一盞生薑二片棗一枚葱白

二寸煎至七分日午臨卧溫服常服無忌有孕莫服

婦人風虛勞冷方論第四 凡二方

夫婦人風虛勞冷者是人體虛勞而受於冷也夫人將攝順理則血氣調和風寒暑濕不能為害若勞傷氣血便至虛損則風冷乘虛而干之或客於經絡或入於腹內其經絡得於冷則氣血凝滯不能自溫於肌膚也腹內得於風冷則脾胃氣弱不能消於飲食也隨其所傷變成疾病若大腸虛者則變下利若風冷入於子臟則令臟冷致令無子若搏於血則澁壅亦令經水不利斷

絕不通也

澤蘭散 治婦人風虛勞冷氣攻心腹疼痛肢節拘急
體瘦無力經候不調飲食減少

牡丹皮 赤芍藥 栢子仁 續斷 各半 麝香 分

澤蘭葉 二兩 當歸 延胡索 桂心 附子 炮 川牛

膝 川芎 桃仁 乾漆 炒 琥珀 沒藥 木香

各三分

右十七味為細末每服二錢溫酒調下

紫石英圓 治婦人風虛勞冷經候不調四肢羸弱不能飲食

紫石英 熟乾地黃

白石英

各二兩續斷

白芍

藥 桂心

木香

當歸

白朮

乾薑

白薇

各半兩

川牛膝

川芎

北五味子

人參

各三分

椒

紅炒附子

黃耆

各一兩

右為末煉蜜為元如梧桐子大每服三十元溫酒吞下空心服

婦人冷勞方論第五

凡七方

夫婦人冷勞者由血氣不足表裏俱虛臟腑久挾宿冷致令飲食不消腹內積聚臍下冷痛月候不調骨節痠痛手足無力肌膚羸瘦面色痿黃故曰冷勞也

桃仁散 治婦人冷勞氣滯經脉不通腹脇妨悶四肢羸瘦不思飲食

木香 訶子 白薑 桃仁 人參

各半兩

陳皮

琥珀 桂心 赤芍藥 延胡索 赤茯苓

各一兩

川牛膝 當歸 白朮

各三分

右咬咀每服四錢水一盞薑三片煎至七分去滓空

心溫服

木香元 治婦人冷勞經脈不調臟腑氣滯四肢疼痛
飲食無味漸加羸瘦

木香 琥珀 吳茱萸 當歸 牡丹皮 赤芍

藥 三稜 附子炮 延胡索 川芎

各三分

乾薑

人參 桂心

各半兩

北柴胡

白朮

鼈甲

醋煮去裙炙

厚朴 熟地黄 陳橘皮

各一兩

右為末煉蜜元如梧桐子大每服三十元空心溫酒

下

熟乾地黄元 治婦人冷勞虛損肌體消瘦顏色痿黃

四肢無力月候不調少思飲食

乾熟地黄 鼈甲 陳皮

各一兩

北五味子

當歸

川芎 桂心

各半兩

川牛膝

人參

白芍藥

白朮 附子 白茯苓 黃耆

各三分

甘草

一分

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下三十元

礪砂煎元 治婦人冷勞心腹積聚腹脇疼痛四肢羸

瘦不食

鼈甲

炙醋桃仁去皮尖

木香

五靈脂

去砂石炒當歸各一

兩

礪砂

二兩醋一升熬成膏

右為細末用礪砂膏為元如梧桐子大空心溫酒下

二十元

煮肝散

治婦人冷勞脾胃虛之大腸轉洩水穀不化

四肢羸瘦口内生瘡不思飲食漸加無力宜服此藥

北柴胡 縮砂仁 蒔蘿 華撥

各三分

白朮 白

芷 胡椒 白薑 陳皮 山茵陳 人參 蕪

荑仁 木香 紫苑 白芍藥 北細辛 桂心

各半兩

右為細末以獾猪肝一具去脂膜切如柳葉片以新汲水洗過入葱白三寸細切入藥末半兩於銚內以新水二大錢入鹽醋少許以瓷碗合煮令水盡空心

以意食之喫粥飲下食後良久飲暖酒一盞為妙晚
食前再服亦佳

煮肝散 治婦人冷勞面色痿黃不多思食或時腹痛
四肢少力積漸羸瘦

白芍藥 川芎 苦梗 厚朴 桂心

各三分

陳皮

一兩半 白薑 當歸 荊芥穗 蒔蘿 胡椒 蕪

荑仁 藁本 柴胡 紫苑

各半兩

右為細末每服半兩以豬肝一具用鹽醋葱白各

少許相和如尋常煮熟空心任意食之然後飲溫酒
二錢尤佳

大香甲元散 治婦人血臟風虛冷氣肌肉黃瘦飲食
進退經候不調心腹多脹漸變如勞補血海調氣

鼈甲

醋炙
一兩

沉香

柴胡

人參

川芎

羌活

當歸

附子

炮去
皮

木香

安息香

桔梗

茯苓

藿香葉

陳橘皮

牡丹皮

三稜

厚朴

薑汁

炙桂心

桃仁

去皮

牛膝

去苗各
半兩

檳榔

和皮大

腹子

各一分

右為細末每服二錢水一盞生薑烏梅各少許煎至

八分溫服餘一半更加乾漆

炒一分

阿魏

半分

赤芍藥

一分

同為末煉蜜元如梧桐子大空心煎烏梅地黃湯下

二三十元與散子相間服

博濟方

婦人大全良方卷五

欽定四庫全書

子部

婦人大全良方卷六

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣葉蘭

謄錄舉人臣馮盡

欽定四庫全書

婦人大全良方卷六

宋 陳自明 撰

婦人熱勞方論第一

夫婦人熱勞者由心肺壅熱傷於氣血氣血不調臟腑壅滯熱毒積蓄在內不得宣通之所致也其候心神煩躁頰赤頭疼眼澁唇乾四肢壯熱煩渴不止口舌生瘡神思昏沈多臥少起飲食無味舉體痠疼或時心怔或時盜汗肌膚日漸消瘦故名熱勞也

欽定四庫全書

婦人大全良方
卷六

黃耆散 治婦人熱勞羸瘦四肢煩疼心躁口乾不欲飲食

人參

黃芩

當歸

各三分

北柴胡

去苗兩半

黃耆

地

骨皮

赤茯苓

麥門冬

生地黃

赤芍藥

各一

兩

甘草

一分

右以咀每服四錢水一盞薑五片煎六分去滓溫服

無時

半夏散 治婦人熱勞煩渴口乾體瘦無力四肢疼痛
或時寒熱痰逆嘔吐不思飲食

半夏 知母 苦梗 人參 赤茯苓 秦艽

赤芍藥 麥門冬 烏梅肉 鼈甲各半兩 北柴胡醋炙

黃耆各一兩 大腹皮三分 甘草一分

右為粗末每服四大錢水一盞半生薑三片煎至七
分去滓溫服無時候

豬肚元 治婦人熱勞羸瘦

北柴胡

赤茯苓

人參

黃耆

各一兩

黃連

三地兩

骨皮

木香

各半兩

桃仁

鼈甲

各一兩半

右為細末用好嫩猪肚一枚淨洗將藥末入猪肚內以線縫合烝令爛熟於砂盆內研如膏員如梧桐子大食前粥飲下三十元午食前再服

秦艽散

治血經有熱月脈凝滯五心煩倦

出婦人經驗方

麥門冬

秦艽

各一兩

生地黃

當歸

各半兩

地骨皮

鬱金

蘇木

各一分

右為細末每服一錢半水一盞紅花少許同煎至七分溫服若經脈調不用紅花忌酒與熱物此方可服
一年

婦人客熱方論第二

凡三方

夫婦人有氣血陰陽臟腑虛實實則生熱虛則受邪邪熱加人陰陽冷熱自相乘也今云客熱者是體虛而將溫過度外熱加之非臟腑自生故云客熱其狀上焦胃鬲之間虛熱躁心煩手足壯熱者是也

麥門冬散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

麥門冬 北柴胡 赤茯苓 各一兩 羚羊角屑 赤

芍藥 桑白皮 黃耆 各三分 生乾地黄 甘草 各半

兩

右呖咀每服四錢水一盞薑三片煎六分去滓溫服
無時候

犀角散 治婦人客熱四肢煩悶疼痛不下飲食

犀角屑 赤芍藥 地骨皮 紅花 甘草 各半兩

北紫胡一兩 黃耆一兩 麥門冬 人參 枳殼

赤茯苓各三分

右以咀每服四錢水一盞半薑三片煎七分去滓無時溫服

黃耆散 治婦人客熱心胃壅悶肢節煩疼不思飲食

生乾地黄 黃耆各一兩 犀角屑 甘草 瓜樓子

仁 黃芩各半兩 人參 茯苓各三分

右為細末每服二錢水一中盞淡竹葉五片煎至七

分溫服無時候

婦人寒熱方證第三

凡四方

經云陽不足則先寒後熱陰不足則先熱後寒夫婦人勞傷氣血虛弱令陰陽交爭虛實不調故令寒熱如瘧也

地骨皮散 治婦人血風氣體虛發歇寒熱

北柴胡 地骨皮 一兩 桑白皮 枳殼 前胡

黃耆 各三分 白茯苓 五加皮 人參 甘草 桂

心

白芍藥

各半兩

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

溫服無時候

生地黄散 治婦人血氣不調或時寒熱體痛不思飲

食

生乾地黄

北柴胡

各一兩

羌活

木香

桂心

防風

各半兩

酸棗仁

羚羊角屑

白芍藥

白朮

黃耆

川牛膝

白茯苓

當歸

枳殼

各三分

右呖咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓溫服空心

柴胡散 治婦人寒熱體瘦肢節疼痛口乾心煩不欲飲食

北柴胡 黃耆 赤茯苓 白朮各一兩 人參 地

骨皮 枳殼製 生乾地黄 苦梗 桑白皮 赤

芍藥各三分 鱖甲炙二兩 麥門冬三兩 甘草半兩

右呖咀每服四錢水盞半薑三片煎七分去滓溫服

無時候

荊芥散 療時氣風溫寒熱瘴瘧往來潮熱並宜服之

陳皮 麻黃 香附子 甘草 各一兩 荊芥穗 厚

朴 各二兩 草果仁 三箇 川白芷 桂心 各半兩

右咬咀每服二錢水一大盞薑三片棗兩枚煎至七分去滓溫服無時候

寡婦寒熱如瘧方論第四 凡一方

論曰寡婦之病自古未有言者惟倉公傳與褚澄略而

論及言寡者孟子正謂無夫曰寡是也如師尼喪夫之婦獨陰無陽欲男子而不可得是以懨懨成病也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陽獨陰可乎夫既處閨門慾心萌而不遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類瘡疾久則為勞又有經閉白淫痰逆頭風膈氣痞悶面黥瘦瘠等證皆寡婦之病診其脉獨肝脉弦出寸口而上魚際究其脉原其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

生地黃元 許學士云有一師尼患惡風體倦乍寒乍熱面赤心煩或時自汗是時疫氣大行醫見寒熱作傷寒治之大小柴胡湯雜進數日病劇予診視之曰三部無寒邪脈但厥陰肝脈弦長而上魚際宜服抑陰等藥予製此方治之愈

北柴胡 秦艽 黃芩

各半兩

生地黃 赤芍藥

二兩 一兩

右為細末煉蜜為元如梧桐子大烏梅煎湯下三十

元無時候日三服

許學士云嘗讀史記倉公傳載齊北王侍人韓女病腰背痛乍寒乍

熱衆醫皆以為寒熱病也倉公曰病得之欲男子而不可得也何以知欲男子而不可得診其脈肝脈弦出寸口是以知之又有婦人熱入血室寒熱如瘧一證在本卷第十論

婦人惡寒方論第五

凡一方

論曰夫婦人惡寒者亦有陰陽二證發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者發於陰也發於陽者宜解表服必浮數發於陰者宜溫裏脈必沈細又有汗後利後惡寒及背惡寒已上疾證方治并載百問不復繁引僕嘗治一婦人但惡寒別無他證六脈平靜遂用敗毒散而

安此藥能去表中風邪故也經云惡寒家慎不可過當
覆衣被及近火氣寒熱相薄脈道沈伏愈令病人寒不
可遏但去被徹火兼以和表之藥自然不惡寒矣婦人
惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結聚針藥所以不能
治矣

敗毒散 見局方

婦人血風煩悶方論第六

凡四方

夫婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪乘之

搏於血使氣不宣而否澁則生於熱或肢節煩疼口乾少臥皆因虛弱而氣血壅滯故煩悶也

川烏頭元 治婦人血風虛冷月候不調或即脚手心煩熱或即頭面浮腫頑麻

川烏頭

一斤用好清油 各四兩一處於銚內炭

度逐旋取出了於新瓦上或不裂者不用裂者則去皮尖脂

五靈脂

去土石揀淨四兩生

右為細末更入臼中或乳鉢內研令停後將蒸餅水浸後却瀝去水漸漸入臼中和杵直待元得即元如

梧桐子大空心溫酒或鹽湯下二十元忌動風物
夫風疾亦治

赤芍藥散 治婦人氣血不和心胃煩悶不思飲食四肢少力頭目昏眩身體疼痛

牡丹皮 白茯苓 赤芍藥 白芷 甘草

各一兩

柴胡

一兩半

右為細末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至七分溫服食後臨臥

酸棗仁散

治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多躁喫

食減少

酸棗仁

赤芍藥

當歸

羚羊角屑

赤茯苓

紅花

生地黃

各三分

防風

羌活

川牛膝

麥

門冬

桂心

川芎

地骨皮

甘草

各半兩

右㕮咀每服四錢水盞半薑三片薄荷少許煎七分

溫服

當歸散

治婦人血風潮熱

當歸

二兩芍藥

延胡索

不灰木

熟地黃

各一兩

大黃

三分

桂心

半兩

甘草

一分

右為細末每服二錢水一盞胭脂一小角子煎至六分去滓如躁時放冷服細呷清者

婦人血風攻脾不能食方論第七

凡四方

夫脾象於土脾為中州意智之藏也其肝心肺腎皆受脾之精氣以榮養焉脾與胃為表裏脾主化穀納食胃為水穀之海故經言四時皆以胃氣為本也婦人血氣

不調臟腑勞損風邪冷氣蘊蓄在內攻於脾胃脾胃既虛為邪所乘則不能摧伏五穀故令不能食也

草豆蔻散 治婦人血風冷氣攻脾胃嘔逆不納飲食

人參

一兩

草豆蔻仁

麴裏煨

白茯苓

半夏

各三分

良薑

白朮

縮砂仁

枇杷葉

去毛炙

桂心

木香

青

皮

甘草

各半兩

右為粗末每服三錢水一大盞薑三片煎至七分去

滓溫服無時候

神麴元 治婦人血風攻脾胃腹脇氣滿不思飲食

白朮 附子炮 枳殼製 訶子 桂心 人參 木

香 食茱萸泡 陳皮各一兩 苦梗 乾薑各半兩

右為細末以酒煮神麴末二兩作糊為元如梧桐子
大每服二十元空心薑湯吞下

椒紅元 治婦人血風攻脾胃臟腑虛冷全不思食臍
腹多痛體瘦無力

椒紅 沉香 附子炮 莪朮 訶子 當歸 白

術各一兩 良薑 白豆蔻仁 丁香各半兩 麝香一分

右為細末酒煮麪糊員如梧桐子大空心溫酒下三

十元

進食散 李潜云治脾胃虛寒不思飲食及久病人脾

胃虛全不入食者只兩服能食出蘇沈良方 據愚見此方既

有川烏治血風攻脾不食豈無良驗

青皮 陳皮 粉草 良薑 桂心各一分 川烏炮去

皮草豆蔻仁各三箇 訶子五箇

右為細末每服一錢水一盞薑二片煎至七分溫服

婦人夢與鬼交方論第八 凡三方

夫人稟五行秀氣而生承五藏神氣而養若陰陽調和則臟腑強盛風邪鬼魅不能傷之若攝理失節而血氣虛衰則風邪乘其虛鬼邪干其正然婦人與鬼交通者由臟腑虛神不守故鬼氣得為病也其狀不欲見人如有對晤時獨言笑或時悲泣是也脈息遲伏或如鳥啄皆鬼邪為病也又脈來綿綿不知度數而顏色不變此

亦是此候也

茯神散 治婦人風虛與鬼交通妄有所見聞言語雜

亂

茯神

一兩半

茯苓

人參

石菖蒲

各一兩

赤小豆

半兩

右㕮咀每服三大錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

桃仁元

治婦人與鬼魅交通

辰砂

檳榔

當歸

桃仁

各三分

水銀

一分

棗肉研令星盡

麝香

阿魏

麝香
煨

沉香

各半
兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心桃仁湯吞下十

元

又方

似辟瘟丹

虎頭骨

二兩朱砂

雄黃

雌黃

鬼白

皂莢

蕪荑仁

鬼箭

梨蘆

各一
兩

右件生為末煉蜜為元如彈子大囊盛一元男左女

右繫臂上及用一元當病人戶前燒之一切邪鬼不

敢近

太乙神精丹 蘇合香元皆可用也

婦人傷寒傷風方論第九 凡八方

論曰古人治病先論其所主男子調其氣婦人調其血
血室不蓄則二氣諧和血室凝結則水火相刑傷寒氣
口緊盛即宜下人迎緊盛即宜汗婦人左關浮緊不可
下當發其汗以救血室榮衛得和津液自通決然汗出
而解仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譫語

如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃
氣者言不可下也 小柴胡湯主之若行湯遲則熱入
胃令津燥中焦上焦不榮成血結胃狀須當針期門也
五行相尅以生相扶以出平居之日水常養於木木
相生則榮養血室血室不蓄則脾無蘊積脾無蘊積則
剛燥不生剛燥既生若犯胃氣則晝夜譫語喜忘小腹
滿小便利屬抵當湯證也

傷寒胃實譫語宜下之婦人
熱入血室譫語者不可下也

雖然婦人傷寒與男子治法不同男子先調氣婦人先

調血此大略之詞耳要知脈緊無汗名傷寒脈緩有汗為傷風熱病脈洪大中暑脈細弱其證一也假如中暈用白虎胃實用承氣豈必調血而後行湯邪仲景傷寒論所以不分婦人者良亦在學者皆可隨病於男子藥證中以意選用也 若妊婦傷寒藥性須涼慎不可行桂枝半夏桃仁等藥小柴胡去半夏名黃龍湯益為妊婦而去也大抵產前先安胎產後先補益次服傷寒藥若病稍退則止藥不可盡劑此為大法 黃帝問婦人

重身毒之奈何岐伯曰有故無殞亦無損也大積大聚其可犯衰其太半過其厄 男子婦人傷寒仲景治法別無異議比見民間有婦人傷寒方書稱仲景所撰而王叔和為之序以法考之間有可取疑非古方特假聖人之名以信其說於天下今取金匱玉函治婦人傷寒與俗方中可採者列為一卷雖不足以盡婦人傷寒之詳並可以百問中參用也

婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥舌乾經脈凝滯不

得往來宜桂枝紅花湯

桂枝

芍藥

甘草

三兩紅花二兩

右㕮咀每服五錢水一盞半薑四片棗二个煎至七分去滓溫服良久再服汗出而解

婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食黃芩芍藥湯療之
黃芩 白芍藥 白朮 生乾地黄

右各一兩㕮咀每服五錢水一盞煎至七分去滓溫服寒則加生薑

婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰陽俱虛不可下宜服當歸湯

柴胡

三兩

白朮

二兩

人參

甘草

赤芍藥

當歸

各一

兩

五味子

木通

各半兩

右呖咀每服半兩水一盞半生薑四片棗二枚煎至八分去滓稍熱服

婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便難煩躁譫語目赤毒氣閉塞不得通宜瀉心三黃湯

川大黃

鼠尾黃芩

鷹爪黃連

等分

右為粗末每服四錢水一盞煎至八分去滓溫服取微利如目赤睛疼宜加茯苓嫩竹葉瀉肝之餘氣

婦人傷寒差後猶有餘氣不去謂之遺熱宜乾地黃湯

乾地黃

一大黃

黃連

黃芩

柴胡

白芍藥

甘草

各一兩半

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服取

溽利汗出解

男子病新差婦人與之交合得病名曰陽易其證裏急腰胯及腹內痛身重宜燒裊散

用男子裊襠燒灰為末以水調方寸匕服即愈

婦人病未平復因有所動致熱氣上衝胷手足拘急搐搦如中風狀宜青竹茹湯

栝樓根

二兩
淡青竹茹半升

右以水二升半煮取一升二合去滓分作三服

婦人病未平復因有所動小腹急痛腰胯疼四肢不任

舉動無力發熱者宜當歸白朮湯

桂枝 白朮 當歸 甘草 芍藥 人參 黃

耆

各一分

生附子

一箇破作八片各一分

生薑

半兩

右呖咀水三升煮取一升半去滓通口服一湯盞食頃再服溫覆微汗差

婦人熱入血室方論第十凡五方

婦人傷寒發熱經水適來晝日明了暮則譫語如見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦宜小柴胡湯

婦人傷風七八日續得寒熱發作有時經水適斷此為
熱入血室其血必結故使如瘧狀宜服小柴胡湯

柴胡

八錢重

黃芩

人參

生乾地黄

甘草

各三錢重

半夏

二錢重

右呖咀每服五錢水盞半薑三片棗二枚煎至八分
去滓溫服

局方四物湯 不用熟地黄只用生乾地黄加北柴胡
等分煎服亦療此證

婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如瘧狂言見鬼宜服乾薑柴胡湯

柴胡

四兩 桂枝

一兩半

枳實

二兩 牡蠣

乾薑

甘草

各一兩

右以咀每服五錢水淺半煎七分去滓溫服初服微煩再服汗出而愈

婦人傷寒血結胃脘揉而痛不可撫近宜海蛤散婦人血結胃法當針期門仲景無藥方此方疑非仲景然其

言有理姑存焉

海蛤 滑石

甘草

各二兩

芒硝

一兩

右為細末每服二錢雞子清調下小腸通利則胃膈
血散腫中血聚則小腸壅小腸既壅則腫中血不流
行宜此方小便利血數行更宜桂枝紅花湯發其汗
則愈

婦人傷風發熱惡寒經水適來得七八日熱除脈遲身
涼和胃脇下滿如結胃狀譫語者此為熱入血室也當

刺期門穴隨其實而取之期門穴在乳直下筋骨近腹處是也凡婦人病法當刺期門不用行子午法恐纏藏膜引氣上但下針令病人吸五吸停針良久徐徐出針此是平瀉法也凡針期門必瀉勿補可肥人二寸瘦人寸半深也



婦人咳嗽方論第十一 凡九方

夫婦人咳嗽者由肌體虛外受於寒熱風濕所得也肺為四臟之華益內統諸臟之氣外合於皮毛若為寒熱風濕所傷邪氣自皮毛而入於肺中外皆傷故令咳也大抵治咳不可一槩治當以脈息辨之其脈浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澁者起於寒風者散之濕者燥之熱者涼之寒者溫之虛者補之未有不安者也

咳嗽用溫藥方論第十二

經曰微寒為嗽寒甚為腸辟古人立方治嗽未有不本於溫藥如乾薑桂心細辛之屬以寒氣入裏非辛甘不能發散以此準之未有不因寒而嗽也又曰熱在上焦因欬為肺痿又實則為肺癰虛則為肺痿此人其始或血不足或酒色滋味太過或因服利藥重亡津液燥氣內焚肺金受邪脈數發熱咳嗽膿血病至於此亦已危矣古人立方亦用溫藥如建中之屬今人但見發熱咳

嗽率用柴胡鱉甲門冬葶藶等藥旋踵受弊而不知非
可為深戒就使不可進以溫藥亦須妙以湯元委曲調
治無為鹵莽致傷人命

黃耆散 治虛中有熱咳嗽膿血口苦咽乾

黃耆

四兩

甘草

二兩

右為細末湯點一二錢服日三 一方甘草一兩黃
耆六兩名黃耆六一湯只呖咀水煎服

蛤蚧元 治婦人咳嗽不止漸成勞氣宜服

蛤蚧

一對酥炙

紫苑

款冬花

鱉甲

炙

貝母

去心

皂莢

子仁

各一兩炒

杏仁

炒去皮尖一兩半

右為細末煉蜜員如梧桐子大每服二十元淡薑湯

吞下

含化元 昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺

勞服此安冠宗藥方

枇杷葉

去毛

桑白皮

款冬花

木通

紫苑

杏

仁

各等分

大黃

減半

右為細末煉蜜元如櫻桃大食後夜卧含化一元

貝母湯

治諸嗽久不差

出本
事方

貝母

生薑汁
浸半日

北五味子

黃芩

乾薑

熱者
減半

陳皮

各一
兩

半夏

桑白皮

桂心

北柴胡

熱者加一
半各半兩

木香

甘草

各一
分

右為粗末每服五錢水一瓊半杏仁七箇去皮尖碎
之生薑二片煎至七分去滓熱服黃師文云戊申冬
有姓蔣者其妻積年嗽製此方授之一投而瘥以此

治諸嗽悉皆愈

定喘湯 治丈夫婦人遠年日近肺氣咳嗽上氣喘急
喉中涎聲胃滿氣逆坐臥不安飲食不下及治肺感寒
邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

半夏麴

炒

明阿膠

炒

甘草

各錢半

鴛粟殼

半兩製

北五

味子

桑白皮

麻黃

去節

人參

各一分

右㕮咀每服三大錢薑三片烏梅半箇煎至七分去

滓漸漸溫服食後臨臥服

方同和劑分兩加減不同有欬

滄州李官人宅補肺湯

治狀同前

又名清金湯

鴛粟殼

二兩製

人參

粉草

各半兩

陳皮

茯苓

杏

仁製

白朮

明阿膠

炒

北五味子

桑白皮

薏

苡仁

紫蘇莖

各一兩

右㕮咀為末每服三大錢水殘半薑三片棗兩枚烏梅半箇煎至一殘臨卧溫服僕每用則無效遂加百合貝母去心半夏麴冬花各一兩服之良驗

金不換散

治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿

悶咳嗽涎盛腹脇脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽咳唾紅痰及遠年日近一切喘咳疾諸藥不效者並治之

鴛粟殼

半兩製

杏仁

製

甘草

各三錢

枳殼

四錢

右吹咀每服三錢水一盞半薑三片烏梅半箇煎至

八分食後臨卧漸漸熱服

許元林先生方乙卯年七月僕嘗治一婦人咳嗽不

已服諸藥無效漸成勞瘵求余診之六脈濡弱以愚考之此是血弱又因憂感太過而成斯疾合用當歸等藥治之必愈遂先用古今錄驗橘皮湯空心服蘇子降氣湯後用金釵煎熟地黃元當歸元調理得安

又治一婦人時行感熱咳嗽遂用小柴胡湯去人參薑

棗只加北五味子煎服愈

古今錄驗橘皮湯 療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中
作聲上氣不得下頭痛方

陳皮 紫苑 麻黃去根杏仁製 當歸 桂心 甘

草 黃芩各等分

右呖咀每服五錢水琰半煎至一琰去滓熱服

勞嗽方論第十三 凡二方

經曰人感於寒則受病微則為咳甚則為泄為痛凡咳

嗽五臟六腑皆有之惟肺先受邪蓋肺主氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛故咳為肺病五臟則各以治時受邪六腑則又為五臟所移古人言肺病難愈而善卒死者肺為驕藏怕寒而惡熱故邪氣易傷而難治以其湯散逕過針灸不及故也十種咳嗽者肺咳心咳脾咳腎咳肝咳風咳寒咳支飲咳膽咳厥陰咳華佗所謂五嗽者冷嗽氣嗽燥嗽飲嗽邪嗽孫真人亦有方治寒毒注嗽者歷代方論著之甚詳惟今之所謂勞嗽者無所經

見意其華佗所謂邪嗽真人所謂注嗽者是也此病益
酒色過度勞極傷肺損動經絡其重者咯唾膿血輕者
時發時差又有因虛感邪惡之氣且傳注得之或先嘔
血而後嗽或先咳嗽漸就沈羸此則非特內損肺經又
挾邪惡傳症之氣所以特甚病之毒害無過此也真人
治注嗽通氣元方用蜈蚣四節又云夢與鬼交通及飲
食者全用蜈蚣外臺方四滿元治五嗽亦用蜈蚣遇世
名公能推原其旨意率用蛤蚧天靈蓋桃柳枝麝香丹

砂雄黃安息香之類以通神明之藥療之高出古人之意矣又肺中有蟲如蚕令人喉痒而咳嗽湯散逕過針

灸不及以藥含化蟲死即嗽止

見張銳方

深師四滿元療五嗽一上氣嗽二飲嗽三鰓嗽四冷

嗽五邪嗽

乾薑 桂心 躑躅花 芎藭 紫苑 芫花根

皮各二分 蜈蚣一枚去頭足灸 細辛 甘草炙 鬼督郵 人

參 半夏洗各一分

右十二味為細末煉蜜元如大豆許每服五元米飲
下日三未知加至七八元服此藥無不差忌羊肉錫
生葱生菜海藻松菜

古今錄驗四滿元 療五嗽一氣嗽二痺嗽三鰓嗽四
邪嗽五冷嗽悉療之方

蜈蚣

二枚炙

芫花

根五分熬

躑躅花

炒

乾薑

芎藭

桂

心各四分

人參

細辛

各二分

右為末煉蜜元如梧桐子大米飲下一十元日三服

加至十五元忌生葱生菜

喘滿方論第十四 凡六方

夫喘之為病黃帝問岐伯岐伯對曰夜行則喘出於腎
淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘
出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨當是之時
勇者氣行則已怯者則著而為病也原疾之由雖曰皆
本於肺與氣然感外邪則有太陽證脈浮無汗而喘者
宜麻黃湯陽明病汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱者宜

承氣湯若表邪未解誤服下利藥不止脈促喘而汗出者宜葛根黃連黃芩湯若微喘者桂枝厚朴杏子湯汗出而喘若無大熱者宜麻黃杏子甘草石膏湯若表邪未解心下停水發熱而喘或嘔者小青龍湯去麻黃加杏仁主之若陰證喘促者四肢逆冷脈息沈細或寸大尺小或六脈促疾或心下脹滿結硬或冷汗自出或大便頻數上氣喘促或咽喉不利者此是本氣極虛內外挾寒冷所致使陰寒內消陽氣得復則愈宜返陰丹主

之

已上方並見百問不復錄

僕且以大槩而言之諸藏相乘而喘者

以杏子散如感寒伏熱而喘者以華蓋散九寶湯若暴寒向火覆衣被過當傷熱肺實而喘促者其狀多有熱證宜洗心散冷水調服若因氣宇不調痰盛喘促者宜四七湯兼官局桔梗湯薑煎服若涎多而喘者宜千縉湯橘皮半夏湯若不得臥卧即喘者此由水氣逆行上乘於肺肺得水則浮而開使氣不得通流其脈沈大宜神秘湯肺之積名曰息責在右脅下大如杯令人洒淅

寒熱喘咳發癰疽宜棗膏元若上氣喘者神授湯若上
盛下弱而喘促者宜蘇子降氣湯吞黑錫丹若尊年之
人素來稟賦太厚不任熱藥者不可輕投丹劑及諸熱
藥但以秘傳降氣湯分心氣飲論之梗槩不出於此矣
若素有脚氣而喘者當作脚氣治之又有骨蒸勞喘自
有專門不敢濫及

神秘湯 治水氣乘肺而喘兼療支飲而喘

陳橘皮

洗去白

紫蘇葉

人參

桑白皮

生薑

等分

右吹咀每服半兩水煎去滓溫服

杏子散 治諸藏相乘喘急

杏仁

去皮尖雙仁麩炒黃細研如膏

麻黃根

為細末等分

右和煎橘皮湯調下二錢無時候

千緡湯

齊州半夏

七枚炮裂四片破之

皂角

去皮炙二寸

甘草

炙一寸

生薑

如指大

右同以水一椀煮去半頓服沈興宗待制嘗病痰喘

不能臥人扶而坐數日客有見之曰我曾如此得良藥一服差我以千緡酬之謂之千緡湯可試為之興宗得湯一服而差

棗膏元 療息賁

葶藶

研細

陳皮

苦梗

各等分

右後二味為末入葶藶令停煮肥棗肉研為膏和圓如梧子大每服五七丸飲下 許學士云予嘗患停飲水積肺經食已必噎漸喘覺肺系急服此良驗

神授湯 治上氣喘急不得卧

橘紅 苦梗 紫蘇 人參 北五味子等分

右咬咀每服四錢水一錢煎至六分去滓食後服

九寶湯 治感風伏熱一切咳嗽喘急不問高年小兒室女產前產後皆可服惟虛勞自汗不可服

薄荷葉 紫蘇 大腹皮 洗麻黃 桑白皮

去根節
各四錢

桂心 杏仁 陳橘皮 甘草

去皮
尖

各二
兩

右咬咀每服半兩水一錢半薑十片烏梅一箇煎至

六分去滓溫服食後 有兩浙張大夫病喘二十年
每至秋冬輒劇不可坐卧百方不差後得臨平僧法
本方服之遂差法本凡病三十年服此藥半年乃絕
根本永不復發凡服此藥須久乃差

官局桔梗湯

橘皮半夏湯

洗心散

華蓋散

並見局方

不復贅錄

四七湯

見本卷二十卷

僕嘗療羅安人年近六十遇秋

冬之交上氣喘促不能坐卧六脈洪實服諸藥無效問
疾之原少年自川中任所服餌丹砂又恐是丹毒為害

遂服洗心散無效僕以華蓋散數服而愈謾記之

婦人風痰方論第十五 凡八方

夫婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於胸膈所成也人皆有痰少者不能為妨多者成患但胸膈有痰飲漬於五臟則令眼暈亦令頭眩頭痛也

評曰夫痰之為害多因外感五邪

五邪者寒暑燥濕風

內傷七

氣

七氣者喜怒哀思驚恐志

因五邪而得者得風為風痰得寒為

寒痰得冷為冷痰得熱為熱痰得暑為暑痰因七氣

所傷者多因婦人性情執著不能容忍而有此證豈特只因風冷而成哉所以外感五邪內傷七氣則一身之中血液淚汗涕唾身中濕者敗濁變而成痰乘間而為害也經云清則運為精華濁則凝為痰飲此之謂也然有痰涎飲沫四種相類宜仔細詳辯調治因風而生痰者宜服三生飲星香飲青州白元子化痰元方見局方因寒冷而得者宜服降氣湯黑錫丹養正丹並見局方因熱而得者宜服金沸草散柴胡半夏湯因

暑而得者消暑元

並見局方

因氣字不調鬱結而成者宜

服參蘇飲四七湯二陳湯痰在上者以瓜蒂散吐之

在下者以控涎丹利之雖曰可吐可下亦要觀人之
勇怯察脈之虛實方可投之切記不宜痛擊暴下所
以初虞世有金虎碧霞之戒者此也

三生飲 星香飲

參蘇飲

方並見第三卷第一論

控涎丹

方見第三卷第六論

養正丹

方見第四卷第四論

旋覆花湯 治婦人風痰嘔逆不下飲食頭目昏悶

旋覆花

去蒂 枇杷葉

去毛炙

川芎

北細辛

藿香

桂心

枳殼

去穰麩炒

前胡

人參

去蘆

羌活

半夏

各半兩

甘草

羚羊角

屑

赤茯苓

各三分

右為粗末每服三錢水一椀薑三片煎至七分去滓

溫服

天南星元 治婦人風痰心膈壅滯

天南星

白附子

並炮

皂莢仁

炒黃

半夏

各一兩

麝香

半兩 枯

右為細末以酒煮麴糊圓如梧桐子大每服十元生薑薄荷湯吞下

又方

半夏

天南星

各二兩

肥皂莢

五挺

生薑

三兩

右以水五升一同煮令水盡去皂莢生薑只用半夏南星焙乾為末以酒煮麴糊圓如梧桐子大生薑薄荷湯下七元

柴胡半夏湯

治痰熱頭痛利膈除煩悶手足煩熱榮

衛不調肢節拘攣身體疼痛嗜卧少力飲食無味兼治
五嗽痰癖

柴胡

八兩

半夏

三兩

人參

去蘆

甘草

黃芩

麥門冬

各三兩

白朮

二兩

右咬咀每服五錢水琰半薑五片棗一枚煎至八分
去滓服

金沸草散 治傷寒中脘有痰令人壯熱頭痛筋脈急
時發寒熱皆類傷風

荊芥穗

四兩半夏

甘草

北細辛

各一兩

赤茯苓

二兩

前胡

旋覆花

各三兩

右為細末每服二錢水一盞生薑五片棗一枚煎至

六分熱服未知再服

局方有麻黃赤芍藥無細辛茯苓

瓜蒂散 療病如桂枝證頭不痛項不强寸脈微浮胸中痞鞭氣上衝喉咽不得息者此為胸中有痰也當吐之宜服此

瓜蒂

炒黃

赤小豆

各半兩

右為細末取一錢匕豉一合湯七合先漬之須臾煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服不吐少少加得快吐乃止諸亡血虛家不可與之

脈微大忌
令人吐

大半夏湯 治痰飲及脾胃不和

半夏 白茯苓 生薑

各一分

右咬咀作一服每遇膈間有寒痰以水二瓊煎至一瓊去滓臨卧溫呷如有熱痰加炙甘草一分如脾胃不和去甘草加陳橘皮一分同煎此即二陳湯加減

得理

四七湯 治喜怒哀思憂恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七氣所為也或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之 婦人性情執着不能寬解多被七氣所傷遂致氣填胸臆或如梅核上塞咽喉甚者滿悶欲絕產婦尤多此證宜服此劑間以香附子藥久服取效切不可謂紫蘇耗氣且謂新產氣血俱

虛不肯多服用之效驗不可具述

紫蘇葉

二兩

厚朴

三兩

茯苓

四兩

半夏

五兩

右呔咀每服四錢水一錢半薑七片棗一箇煎至六分去滓熱服無時候若因思憂過當小便白濁用此藥吞青州白元子極妙

婦人心胸嘈雜方論第十六

凡二方

夫心胸嘈雜婦人多有此證原疾之由多是痰也皆血液淚汗變成或云是血嘈今人多用猪餘血炒而食之

則愈詳其此理是以血導血歸原爾恰如以鹽梅下涎之義不若用許學士旋覆花湯治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腸鳴多睡口中清水自出脇肋急脹滿痛不欲食此胃氣虛冷所致其脈沉遲弦細是其證也旋覆花湯方

旋覆花 北細辛 橘紅 桂心 人參 甘草

苦梗 白芍藥 半夏

各半兩


赤茯苓

三分

右㕮咀每服四錢水棧半薑七片煎至八分去滓溫

服

局方治惡阻半夏茯苓湯亦妙方見惡阻論中



婦人大全良方卷六